

Aandoening

# Hangend bovenooglid (ptosis)

Een hangend bovenooglid ontstaat doordat de spier die het ooglid optilt niet goed werkt. Hierdoor blijft het ooglid lager hangen dan normaal.

Bij een hangend bovenooglid is maar een klein deel van het oog te zien. Het is een lastige aandoening want het belemmert uw zicht. Vooral bij het naar boven kijken. Een hangend bovenooglid ontstaat langzaam.

Meer informatie? Kijk op Oogfonds.nl. (<https://oogfonds.nl/oogziektes/ptosis/>)

## Onderzoeken

De oogarts bekijkt hoe de spieren van de oogleden functioneren. Daarnaast wordt er ook een algemeen onderzoek gedaan van het oog. Het onderzoek is niet pijnlijk.

## Behandelingen

De oogarts kan een hangend bovenooglid corrigeren met een operatie.

### Operatie bij een hangend ooglid (ptosisoperatie)

Een hangend ooglid kan de oogarts corrigeren met een operatie.

De oogarts maakt bij deze operatie een sneetje in de plooi van het ooglid. Op deze manier is het litteken na de operatie bijna niet zichtbaar.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/operatie-bij-een-hangend-ooglid-ptosisoperatie>

## Poliklinieken en afdelingen

### Oogheelkunde

Het specialisme Oogheelkunde houdt zich bezig met ziekten van het oog.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oogheelkunde>

### Plastische Chirurgie

Plastisch chirurgen voeren operaties uit om de vorm of de functie van een lichaamsdeel te herstellen.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/plastische-chirurgie>