

Aandoening

# Kapselvorming bij borstprothese

Bij kapselvorming is om de prothese heen littekenvorming ontstaan.

Dit litteken trekt samen en zorgt ervoor dat uw borst wat vaster en pijnlijker wordt. Dit gebeurt vaker als we iets in het lichaam plaatsen wat er niet hoort. Denk aan pacemakers, heupprothesen en andere implantaten. Een belangrijk verschil van de borstprothese met andere implantaten, is dat uw borstprothese buigzaam is. De prothese kan dus worden samengedrukt door samentrekken van het littekenweefsel. Hier komen dan ook uw klachten vandaan. Het is niet duidelijk wat precies de oorzaak van de kapselvorming is. Wel is bekend dat bloeding en infecties hieraan bij kunnen dragen.

## Onderzoeken

De plastisch chirurg kan een echo-onderzoek van de borsten aanvragen.

### Echo-onderzoek van de borsten (echografie)

Met een echo van de borsten kan de radioloog of laborant uw borsten met behulp van geluidsgolven (echo) onderzoeken.

De radioloog beweegt met een klein apparaat (transducer) over uw borsten. Het apparaat vangt de geluidsgolven op en zet deze om tot een beeld.

Het onderzoek naar - en de behandeling van - borstafwijkingen bij mannen is vrijwel hetzelfde als bij vrouwen. De informatie is zowel van toepassing op vrouwen als op mannen. Omdat borstafwijkingen en borstkanker vooral voorkomen bij vrouwen is sommige informatie specifiek voor vrouwen.

**LET OP!** U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed door. Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/echo-onderzoek-van-de-borsten-echografie>

## Behandelingen

De plastisch chirurg probeert met een operatie het litteken te verruimen. Hierdoor krijgt de prothese weer meer ruimte en de borst voelt weer soepel aan.

### Operatie bij kapselvorming borstprothese

Als u last heeft van kapselvorming om één of beide borstprothesen, kan een operatie nodig zijn.

Kapselvorming betekent dat er littekenvorming om de prothese heen is ontstaan. Dit litteken trekt samen en zorgt ervoor dat de borst wat vaster en pijnlijker wordt. De plastisch chirurg kan het kapsel insnijden of verwijderen. Hierdoor wordt het litteken verruimd. Tijdens de behandeling beoordeelt de plastisch chirurg of de prothese vervangen moet worden.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/operatie-bij-kapselvorming-borstprothese>

# Poliklinieken en afdelingen

## Plastische Chirurgie

Plastisch chirurgen voeren operaties uit om de vorm of de functie van een lichaamsdeel te herstellen.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/plastische-chirurgie>

Code PCH-047