

Aandoening

Vroeggeboorte

Als uw kindje voor de 37ste zwangerschapsweek wordt geboren, dan noemen we dat een vroeggeboorte. Dit komt bij ongeveer één op de tien zwangerschappen voor.

Als uw kindje te vroeg geboren dreigt te worden, dan krijgt u te vroeg tijdens de zwangerschap weeën. Deze zogenoemde vroegtijdige weeën voelen in principe hetzelfde als weeën rond de uitgerekende datum. U kunt eventueel ook bloed, slijm en/of vruchtwater verliezen. Soms begint een vroegtijdige bevalling met het breken van de vliezen. U merkt dan dat u vocht verliest.

Als uw kindje te vroeg wordt geboren heeft het extra medische verzorging nodig, omdat het nog niet helemaal is volgroeid. We proberen daarom de bevalling uit te stellen als u te vroeg tijdens de zwangerschap weeën krijgt.

Onderzoeken

Als u voor de 37ste zwangerschapsweek weeën krijgt, bepalen we met een inwendige echo of er al ontsluiting is.

De gynaecoloog kan op de echo zien hoe uw kindje precies ligt. Met een CTG wordt de weeënactiviteit geregistreerd en weten we hoe uw kindje hierop reageert. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk en temperatuur.

Als uw vliezen al gebroken zijn, is er kans op infecties. Daarom doet de gynaecoloog in dit geval meestal ook geen inwendig onderzoek meer. U krijgt wel een inwendige echo om de lengte van de baarmoedermond te meten. Met bijvoorbeeld een bloed- of urineonderzoek controleren we of u geen infecties heeft.

CTG-onderzoek

Een CTG is een hartfilmpje van uw ongeboren kindje.

Met een CTG wordt het kloppen van het hart van uw kindje geregistreerd. Ook kunnen we zien of u weeënactiviteit heeft. Een CTG kunnen we maken tijdens de zwangerschap of bevalling.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/ctg-onderzoek>

Bloedprikken

Bij bloedonderzoek nemen we 1 of meer buisjes bloed af met een hol naaldje. Dit bloed wordt in het laboratorium onderzocht.

Bloedonderzoek of onderzoek van urine of ontlasting is nodig als uw arts meer wil weten over:

- uw gezondheid;
- het verloop van uw ziekte;
- het resultaat van een behandeling.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/bloedprikken>

Urineonderzoek

Urineonderzoek kan nodig zijn wanneer de huisarts of specialist denkt dat er sprake is van een ziekte.

U krijgt van uw behandelend arts hiervoor de juiste materialen mee. Dit is een pakketje met een urinepotje en een urinebuisje. De instructies voor het opvangen van uw urine, krijgt u van de arts die het onderzoek aanvraagt.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/urineonderzoek>

Behandelingen

Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u voor de 37ste week van uw zwangerschap denkt dat u weeën heeft of dat de vliezen zijn gebroken. Ga liggen tot u hoort wat u verder moet doen. Als uw kindje te vroeg geboren dreigt te worden, wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Beginnen de weeën voor de 34ste week van de zwangerschap? Dan proberen we de weeënactiviteit te remmen met medicijnen. Ook krijgt u medicijnen (corticosteroiden) voorgeschreven om ervoor te zorgen dat de longen en andere organen van het kindje rijpen. Deze medicijnen hebben na 48 uur het maximale effect bereikt. Dan kunnen we stoppen met het remmen van de weeën.

Als de bevalling niet meer tegen te houden is en uw kindje te vroeg geboren wordt, dan is de kinderarts aanwezig bij de bevalling om uw kindje zo goed mogelijk op te vangen. Als uw kindje voor de 30e à 32e week geboren dreigt te worden, wordt u indien mogelijk overgeplaatst naar een centrum met een neonatale intensive care (NICU). Dit is een intensive care speciaal voor te vroeg geboren baby's.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt in dit verband samen met het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Het kan ook zijn dat u naar het RadboudUMC in Nijmegen, het UMC Utrecht of een ander ziekenhuis gaat.

Bevallen in het ziekenhuis

Er zijn verschillende redenen om in het ziekenhuis te bevallen.

Soms is het medisch noodzakelijk. Maar u kunt er ook zelf voor kiezen om in het ziekenhuis te bevallen. Dit noemen we een poliklinische bevalling. In de folder 'Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis' vindt u praktische informatie over bevallen in het ziekenhuis. Kijk voor meer informatie ook op de pagina 'Zwangerschap en bevalling' (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/zwangerschap-bevalling>).

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/bevallen-in-het-ziekenhuis>

Poliklinieken en afdelingen

Gynaecologie en Verloskunde

Het specialisme Gynaecologie en Verloskunde houdt zich bezig met de medische zorg voor de vrouw in al haar levensfasen.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/gynaecologie-en-verloskunde>

Code GYN-124