MS & griepprik

Als u MS heeft kunt u de griepprik halen.

Meestal zijn mensen met MS niet gevoeliger voor het griepvirus (influenza) dan andere mensen. Het is ook niet extra gevaarlijk, tenzij u ernstige beperkingen heeft (bijvoorbeeld als u rolstoelgebonden bent).

De vaccinatie tegen seizoensgriep (griepprik) is goed onderzocht. Het wordt goed verdragen en veroorzaakt geen MS-aanvallen (schub/exacerbatie) of nieuwe activiteiten op de MRI. Een doorgemaakte griep met hoge koorts kan verergering geven van bestaande MS-klachten (pseudoschub) en weinig frequent kan een doorgemaakte griep met hoge koorts leiden tot een MS schub.

Moet ik een griepprik halen?

Voor een griepprik geldt bij MS geen standaardadvies. Als u door MS ernstige beperkingen heeft (bijvoorbeeld wanneer u rolstoelgebonden bent), adviseren wij u om een griepprik sterk te overwegen. De uiteindelijke keuze ligt bij u zelf.

Heeft u nog vragen over de griepvaccinatie, neem dan contact op met de MS-verpleegkundige.

Als u besluit zich te laten vaccineren tegen de griep, gelden per medicijn(groep) de volgende adviezen:

Interferon-beta (Avonex®, Betaferon®, Rebif®, Plegridy®) en glatirameer-acetaat (Copaxone®, Mylan®)

Vaccinatie zodra mogelijk.

Teriflunomide (Aubagio®) en dimethylfumaraat (Tecfidera®)

Vaccinatie zodra mogelijk.

Fingolimod (Gilenya®), ozanimod (Zeposia®), ponesimod (Ponvory®), siponimod (Mayzent®)

Vaccinatie het liefst 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of zodra mogelijk als u dit medicijn al gebruikt.

Natalizumab (Tysabri®)

Vaccinatie zodra mogelijk.

Ocrelizumab (Ocrevus®), ofatumumab (Kesimpta®)

- Ocrelizumab: vaccinatie het liefst 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of 3 tot 5 maanden na de laatste gift, als u al gestart bent met de behandeling.
- Ofatumumab: vaccinatie het liefst 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of zodra mogelijk als u dit medicijn al gebruikt.

Cladribine (Mavenclad®)

Vaccinatie het liefst 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of zodra mogelijk als u dit medicijn al gebruikt.

Alemtuzumab (Lemtrada®)

Vaccinatie het liefst 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of 6 maanden na de laatste gift, als u al gestart bent met de behandeling.

Methylprednisolon stootkuur

Vaccinatie het liefst minimaal 3 tot 5 dagen na de laatste gift.

Stamcelbehandeling

Vaccinatie het liefst 2 tot 4 weken voordat u start met de behandeling of 3 maanden daarna.

Code NEU-332

Copyright 2026 Jeroen Bosch Ziekenhuis