

Behandeling

Anti-hormonale therapie met letrozol bij borstkanker

De arts kan letrozol voorschrijven bij vrouwen die al in de overgang zijn (postmenopauzaal).

Na de menopauze maken de eierstokken geen oestrogeen meer aan. Op andere plaatsen in uw lichaam wordt nog wel oestrogeen aangemaakt. Namelijk in het vetweefsel en in de bijniere. Letrozol remt de aanmaak van oestrogeen op deze plekken. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden. Letrozol bereikt de kankercellen in uw borst. Maar ook de eventuele kankercellen die in het bloed en/of de lymfebanen terecht zijn gekomen (om zich ergens anders in het lichaam te nestelen).

Daarnaast kan de arts letrozol voorschrijven bij vrouwen met borstkanker die niet meteen of niet meer te opereren is. Of als is aangetoond dat er al uitzaaiingen (metastasen) zijn. Dit is een palliatieve behandeling.

(073) 553 82 25.

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Hoe gebruikt u letrozol?

- U neemt 1 keer per dag 1 tablet van 2,5 mg.
- U neemt de tablet heel in met water.
- U kunt de tablet het beste steeds op dezelfde tijd innemen.

Geneesmiddelen en milieu

- Bestel niet meer medicijnen dan u denkt nodig te hebben.
- Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
- Lever oude medicijnen in bij de apotheek als u ze niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Betrouwbare informatie over medicijnen nodig?

Kijk hiervoor op www.apotheek.nl (<https://www.apotheek.nl>)

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Uitgebreide informatie over de mogelijke bijwerkingen leest u in de folder 'Bijwerkingen bij anti-hormonale therapie'.

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/bijwerkingen-bij-anti-hormonale-therapie>)

- Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid- en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
- Onvruchtbaarheid.
- Gewrichtsklachten.
- Osteoporose (botontkalking) en botbreuken.
- Misselijkheid.
- Trombose en hart- en vaatziekten.

Wat moet u weten tijdens het gebruik van letrozol?

Meestal wordt letrozol goed verdragen.

- Neem bij vaginaal bloedverlies altijd contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.
- Bij het gebruik van letrozol is er een groter risico op botontkalking.
- 30 tot 40% van de vrouwen die behandeld worden met letrozol heeft last van (soms ernstige) bot- en gewrichtsklachten.
- Bij uitgezaaide borstkanker moet u letrozol minimaal 3 maanden gebruiken om te kunnen beoordelen of het medicijn werkt.
- Als u uitzaaiingen in de botten heeft, kan na het starten van de letrozol de pijn in de botten tijdelijk erger worden en daarna pas weer verminderen. Dit betekent niet dat de behandeling niet werkt. Aanhoudende en toenemende pijn zijn wel redenen om contact op te nemen met uw arts of verpleegkundig specialist.

Afspraken

Krijgt u last krijgt van bijwerkingen (behalve klachten die wijzen op trombose of een longembolie)? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken af te wachten, als dat mogelijk is. Vaak verdwijnen de klachten na een tijdje weer als uw lichaam gewend is aan de behandeling.

Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundig specialist. Zij kunnen u tips geven over hoe u de last die u van bijwerkingen heeft kunt verminderen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren? Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoonnummer **(073) 553 82 25**.

- Met medische vragen en/of zorgproblemen vragen we u als het kan te bellen van maandag t/m vrijdag tussen **09.00 - 10.30 uur**. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
- Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen.

Spoedvragen buiten kantooruren

Heeft u een probleem buiten kantoor tijden dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oncologisch-centrum>)

Borstcentrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/borstcentrum>)

Code ONC-217