

Behandeling

# Behandeling maagbacterie (Helicobacter Pylori) 1e lijns behandeling

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

## 1. Stoppen met uw eigen maagbeschermer

Stop met uw eigen maagbeschermer, bijvoorbeeld omeprazol, pantoprazol, famotidine.

## 2. Start met de medicijnen hieronder

Neem deze medicijnen het liefst in **om 10.00 uur en 22.00 uur**. U neemt dus 4 tabletten per keer in.

- Amoxicilline 500 mg: **2 keer per dag 2 tabletten**
- Claritromycine 500 mg: **2 keer per dag 1 tablet**
- Esomeprazol 20 mg (= maagbeschermer): **2 keer per dag 1 tablet**

**Tip:** zet een alarm op uw telefoon om 10.00 en 22.00 uur.

## 3. Na 10 dagen

- Na 10 dagen is de antibiotica op (amoxicilline en claritromycine).
- Ga nog 4 weken door met Esomeprazol 20 mg: **1 keer per dag 1 tablet**.

## 4. Stoppen met esomeprazol

Nadat u 4 weken esomeprazol heeft gebruikt, stopt u ook met dit medicijn. U gebruikt dan 2 weken géén maagbeschermer.

Lukt dit niet door maagpijn of andere klachten? Dan kunt u bellen naar de polikliniek MDL, telefoonnummer (073) 553 30 51.

## 5. Ontlasting inleveren

Na deze 2 weken zonder maagbeschermer:

- Vult u het potje met ontlasting.

- Plak bij het inleveren **2 stickers** op het potje. U krijgt de stickers van microbiologie thuisgestuurd per post.
- Lever het potje in bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de locatie Den Bosch, Drunen, Boxtel, Zaltbommel of Rosmalen.

## 6. Na het inleveren

Na het inleveren van het potje met ontlasting, mag u uw eigen maagbeschermer weer gebruiken zoals u gewend was vóór de behandeling.

Code INT-233