

Behandeling

Behandelplan FPIES

Uw kind heeft een voedselallergie genaamd Food Proteïne Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES).

Food Proteïne Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) is een type allergie waarbij meestal niet de typische 'allergische' symptomen zoals huiduitslag, jeuk en benauwdheid voorkomen. De symptomen van FPIES zijn vooral maag/darm symptomen zoals aanhoudend braken en/of diarree.

Als uw kind een allergische reactie heeft, kan uw kind suf worden en last krijgen van een lage bloeddruk. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk kunt handelen, dus daarom krijgt u dit behandelplan. U kunt het ook aan de hulpdiensten laten zien als het nodig is.

Het behandelplan

Doseerschema ondansetron

De noodmedicatie van uw kind bestaat uit het in de mond geven van een anti-braakmiddel; ondansetron stroop.

Doseerschema Ondansetron stroop 0,8 mg/ml

Gewicht	Ondansetron mg	Ondansetron ml per keer
6-8 kg	0,8 mg	1 ml drank
9-11 kg	1,0 mg	1,2 ml drank
12-14 kg	1,2 mg	1,5 ml drank
15-17 kg	1,6 mg	2,0 ml drank
18-20 kg	2,0 mg	2,5 ml drank

- Bij **braken binnen 30 minuten** na het geven van een dosering:
volledige dosering herhalen
- **Braken tussen de 30-60 minuten** na het geven van een dosering:
halve dosering herhalen
- **Niet meer braken** na het geven van een dosering, dan eventueel de dosering om de 4 uur herhalen,
maximaal 3 x per dag geven

Handel volgens onderstaand schema

