

Behandeling

Endocriene therapie met gosereline bij borstkanker

De arts schrijft goselerine voor bij vrouwen die niet in de overgang zijn (premenopauzaal).

Omdat de borstkanker hormoongevoelig is, wordt u behandeld met endocriene therapie in tabletvorm. Hierbij krijgt u ook endocriene therapie in de vorm van injecties, goselerine. Goselerine zorgt ervoor dat de eierstokken tijdelijk geen oestrogeen aanmaken. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden.

(073) 553 82 25.

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Hoe gebruikt u gosereline?

U krijgt van uw huisarts of verpleegkundig specialist 1 keer per 4 weken of 1 keer per 3 maanden een injectie onder de huid.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Uitgebreide informatie over de mogelijke bijwerkingen leest u in de folder 'Endocriene therapie bij borstkanker'.

(<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/endocriene-therapie-bij-borstkanker>)

- Overgangverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid- en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
- Onvruchtbaarheid.
- Gewrichtsklachten.
- Osteoporose (botontkalking) en botbreuken.
- Misselijkheid.
- Trombose en hart- en vaatziekten.

Wat moet u weten tijdens het gebruik van goselerine?

Meestal wordt goselerine goed verdragen.

- Tijdens de eerste 2 maanden van de behandeling is het belangrijk dat u nog extra maatregelen neemt om een zwangerschap te voorkomen.
- Op de plaats waar u de injectie krijgt, kan soms een blauwe plek ontstaan.

- Neem bij vaginaal bloedverlies altijd contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.
- Zeker in het begin van de behandeling, hebben sommige vrouwen klachten die ze ook kunnen hebben vlak voor hun normale menstruatie. Meestal gaat dit over als u doorgaat met de behandeling.
- Uw borsten kunnen pijnlijk zijn of gespannen aanvoelen.
- Er kan een verandering ontstaan van uw bloeddruk.
- U kunt last hebben van tintelende vingers of tenen.

Afspraken

Krijgt u last krijgt van bijwerkingen (uitgezonderd klachten die horen bij trombose of een longembolie)? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken af te wachten. Vaak verdwijnen de klachten na een tijdje weer als uw lichaam gewend is aan de behandeling.

Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen u tips geven over hoe u de last, die u van bijwerkingen heeft, kunt verminderen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren? Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoonnummer **(073) 553 82 25**.

- Met medische vragen en/of zorgproblemen vragen we u als het kan te bellen van maandag t/m vrijdag tussen **09.00 - 10.30 uur**. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
- Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen

Spoedvragen buiten kantooruren

Voor dringende zaken 's avonds na 17.00 uur, 's nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp: telefoonnummer (073) 553 27 00.

Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oncologisch-centrum>)

Borstcentrum (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/borstcentrum>)

Code ONC-216