

Behandeling

Heupdysplasie operatie bij volwassenen (triple osteotomie)

Om heupdysplasie te corrigeren kan de orthopedisch chirurg een operatie doen.

Hierbij wordt de heupkom op 3 plaatsen losgemaakt van het bekken. Daarna wordt de losse heupkom in een betere positie gedraaid. De nieuwe stand van de heupkom wordt met schroeven vastgezet. De heupkop past beter in de heupkom en daardoor verminderen of verdwijnen de pijnklachten. Deze operatie heet een triple osteotomie. In de folder 'Operatie van de heupkom: triple osteotomie' leest u meer over deze behandeling.

Bekijk de folder

(<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2018-11/PMD-088%20operatie%20van%20de%20heupkom%20triple%20osteotomie.pdf>)

Betrokken afdelingen

Orthopedie (<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/orthopedie>)

Meer informatie

Ervaringsverhaal

(<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2019-10/orthopedie-ervaringsverhaal-triple-osteotomie.pdf>)

Caroline Akkermans werd geopereerd vanwege heupdysplasie. Lees haar ervaringsverhaal in het tijdschrift 'Heupge(w)richt' van de Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling.

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (<https://www.heupafwijkingen.nl>)

Patiëntenvereniging voor kinderen, jongeren en volwassenen met een afwijking van de heup die is ontstaan tijdens de ontwikkeling van de heup.

Code PMD-088