

Behandeling

Midazolam bij een epileptische aanval of koortsstuip bij kinderen

Het medicijn midazolam (Dormicum®) schrijven we voor bij kinderen die 1 of meer koortsstuipen of epileptische aanvallen hebben gehad. Dit medicijn kan een nieuwe aanval stoppen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hoe stopt u een epileptische aanval of koortsstuip?

Een aanval gaat meestal vanzelf over. Toch is het soms nodig om een medicijn te geven om de aanval te stoppen. Dit medicijn kunt u zelf geven aan uw kind, in de vorm van een neusspray.

Afspraken over het geven van de neusspray

De arts spreekt met u af wanneer en hoeveel midazolam neusspray u mag geven.

U kunt hier noteren wat de afspraken zijn:

Naam:
Datum:
Afspraken over de neusspray:

Hoe geeft u de neusspray?

U sprayt de midazolam in 1 of beide neusgaten. Midazolam neusspray wordt door het neusslijmvlies opgenomen en komt zo in de bloedbaan terecht. De aanval stopt dan bijna altijd na een paar minuten.

1. Houd het flesje rechtop en spray een keer in de lucht.
2. U moet het flesje ook rechtop houden als u sprayt. Dat betekent dat u het hoofd en de romp van uw kind iets op moet tillen.
3. Spray daarna het voorgeschreven aantal pufjes in de neusgaten van uw kind. Verdeel de sprays over beide neusgaten. Bij 2 pufjes sprayt u in ieder neusgat 1 keer. Bij 4 pufjes sprayt u in ieder neusgat 2 keer.
4. Onthoud of noteer het tijdstip waarop u de midazolam heeft gegeven

Op de website van Epilepsie.nl kunt u een filmpje bekijken (<https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/neusspray-midazolam/>) over het toedienen van de neusspray.

Andere manier om midazolam te geven

Na de midazolam neusspray heeft het neusslijmvlies 1 tot 2 weken nodig om te herstellen van de zure vloeistof. Heeft uw kind in deze periode midazolam nodig? Dan kunt u dit geven in de wangzak. Dit is de ruimte tussen het gebit en de wang. Ook bij een neusverkoudheid, is sprayen van midazolam via de wangzak een mogelijkheid. De vloeistof wordt via het wanglijmvlies opgenomen in het bloed. De aanval stopt dan bijna altijd na een paar minuten.

1. Sprayt u midazolam via het wanglijmvlies? Dan geldt dezelfde dosering als via de neus.
2. Houd het flesje rechtop en spray een keer in de lucht.
3. U moet het flesje ook rechtop houden als u sprayt. Dat betekent dat u het hoofd en de romp van uw kind iets op moet tillen.
4. Spray daarna het voorgeschreven aantal pufjes aan de binnenkant van de wang. Spray niet richting de keel.
5. Masseer daarna de buitenkant van de wang zodat de vloeistof goed wordt opgenomen.

Wat doet u als de midazolam niet werkt

De vloeistof wordt via het neusslijmvlies of het wanglijmvlies opgenomen in het bloed. De aanval stopt dan bijna altijd na een paar minuten.

Besprek met de arts wat u moet doen als de aanval niet zou stoppen ondanks de midazolam. U kunt bijvoorbeeld nog 1 of meer pufjes geven en/of een ambulance bellen. Houdt u zich hierbij goed aan de gemaakte afspraken met uw arts.

Als uw kind een aanval heeft gehad

Heeft uw kind een aanval gehad? Dan belt u uw behandelend arts. Is de aanval in de avond of nacht? Dan belt u de volgende ochtend. Als u direct hulp nodig heeft, belt u de huisarts of 112.

Heeft u nog vragen?

Stel deze dan gerust aan uw arts. U kunt hiervoor bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04

Praktische tips

Bekijk de zorgverzekering van uw kind

Controleer zelf vóór een afspraak in het JBZ of de zorg voor uw kind wordt vergoed:

- Bekijk hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tarieven>) met welke zorgverzekeraars het JBZ een contract heeft.
- Het hangt ook af van uw polis of uw zorgverzekeraar alle zorg volledig vergoedt.
- Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen eigen risico betaald te worden. **Let op!** Bijvoorbeeld bij bepaalde medicijnen, betaalt u wel

een wettelijke eigen bijdrage. Dit is iets anders dan het eigen risico.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen>) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Kindergeneeskunde (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde>)

Spoedeisende Hulp (SEH) (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/spoedeisende-hulp-seh>)

Code KIN-201