

Behandeling

# PD katheterimplantatie

Om met peritoneaal dialyse (PD) te kunnen starten, is het nodig om een PD-katheter te plaatsen.

Hiervoor is een kleine operatie nodig, de katheterimplantatie. Een PD-katheter is een kunststof slangetje. Via een PD-katheter kan de spoelvoestof in uw buik komen.

**(073) 553 77 46**

Maandag t/m vrijdag 7.30 - 20.30 uur

## Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

## Vorbereiding

Hoe bereidt u zich voor?

## Start lactulose stroop en Bactroban® neuszalf

3 dagen voor de operatie start u met lactulose stroop en met Bactroban® neuszalf 2%. Ook na de operatie blijft u deze gebruiken. U kunt de recepten ophalen bij uw eigen apotheek.

- U neemt 3 keer per dag 15 ml van de lactulose stroop. Hierdoor blijft u ontlasting soepel, waardoor de dialysekatheter zo goed mogelijk gebruikt kan worden.
- U doet 1 keer per dag de Bactroban® neuszalf in beide neusgaten. U krijgt deze om een infectie met een Staphylococcus aureus bacterie te voorkomen en/of te bestrijden.

## Afspraken met de chirurg

Voor de operatie heeft u een afspraak bij de chirurg op de polikliniek Chirurgie. De chirurg bekijkt de mogelijkheden voor het plaatsen van een PD-katheter en bespreekt de operatie met u.

## Informatiefolders voorbereiding dagopname en operatie

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereid op deze operatie. Lees daarom ook de informatie: 'Anesthesie en voorbereiding op een operatie of onderzoek (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/anesthesie>)' goed door.

U wordt voor deze operatie meestal opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Lees hierover de informatie: Voorbereiding op een (dag)opname in het ziekenhuis

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/naar-het-ziekenhuis/voorbereiding-op-een-dagopname-in-het-ziekenhuis>).

## Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

## De behandeling

Hoe verloopt de behandeling?

## Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling. Als u nog bloed moet laten prikken, wijst de medewerker van de Infobalie u eerst naar de afdeling Bloedafname.

## Voor de behandeling

Op de dag van de operatie komt de PD-verpleegkundige bij u langs op de verpleegafdeling om de plaats van de PD-katheter te bepalen. De PD-verpleegkundige houdt hierbij bijvoorbeeld rekening met uw slaaphouding en de plaats van de tailleband van uw broek of rok. Als de plaats bepaald is, zet de PD-verpleegkundige daar een kruisje.

## Tijdens de behandeling

- De katheterimplantatie gebeurt op de operatiekamer. U krijgt algehele anesthesie bij de operatie.
- De chirurg plaatst tijdens de operatie de PD-katheter in uw buikholte.

## Hoe lang duurt de behandeling?

De operatie duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Daarna wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Als u weer goed wakker bent gaat u terug naar de verpleegafdeling.

## Na de behandeling

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de operatie heeft u 2 wondjes van ongeveer 1 centimeter in uw buik. Via de huidpoort komt de katheter uit uw buik. De PD-verpleegkundige komt langs op de afdeling om het verband te controleren.

## Pijn na de operatie

De anesthesioloog schrijft medicijnen tegen de pijn voor. De verpleegkundigen op de verpleegafdeling vragen na de operatie een paar keer hoeveel pijn u heeft. U geeft de pijn een cijfer tussen de 0 en 10. Het is belangrijk dat u de verpleegkundige laat weten hoe het met de pijn is. De medicijnen tegen de pijn kunnen dan op tijd aangepast worden.

Soms heeft u ook schouderpijn. Deze pijn wordt veroorzaakt door een onschuldig koolzuurgas dat tijdens de operatie in uw buik is gebracht. Dit prikkelt het middenrif en voelt aan als schouderpijn. Dit verdwijnt meestal binnen 2 dagen.

## Wat zijn de risico's?

### **Opgeblazen gevoel**

Na de operatie komen uw darmen weer op gang. Dit gaat vaak samen met een opgeblazen gevoel en winderigheid.

### **Obstipatie (moeilijke stoelgang / naar de wc kunnen)**

Omdat na de operatie de darmen soms moeilijk op gang komen, kunt u problemen krijgen met uw stoelgang. U krijgt hiervoor medicijnen.

### **Prikkeling rond de blaas en anus**

Het einde van de katheter ligt onder in de buikholte. De buikholte is bekleed met buikvlies. In dit buikvlies lopen bloedvaten en zenuwen. Wanneer de katheter het buikvlies raakt, veroorzaakt dit prikkelingen. Deze prikkelingen stralen meestal uit naar de blaas en/of anus. Dit wordt meestal als vervelend ervaren. Het innemen van een paracetamol kan helpen tegen deze klachten.

Heeft u last van obstipatie en/of verminderen uw klachten niet van prikkeling rond de blaas en anus na het innemen van paracetamol? Dan kunt u bellen naar de PD-verpleegkundige, telefoonnummer (073) 553 77 46.

## Ontslag uit het ziekenhuis

Na de operatie mag u meestal dezelfde dag weer naar huis.

- U moet met een rolstoel opgehaald worden. Deze rolstoel kan degene die u komt ophalen lenen bij de ingang van het ziekenhuis. Neem hiervoor een 2 euro munt mee.
- U krijgt bij ontslag een afspraak mee voor de wondcontrole na 1 week op de PD-afdeling. Daarna bespreekt de PD-verpleegkundige met u wanneer u mag starten met de PD-training.

## Thuis

Waar moet u thuis op letten?

De eerste 2 weken na de katheterimplantatie heeft uw buik rust nodig. Hierdoor kan de katheter goed vastgroeien in de buikwand. Dit betekent dat u zoveel mogelijk moet voorkomen dat er druk op de buikwand komt te staan. Het is daarom belangrijk dat u:

- geen strakke of knellende kleding of broekband op de huidpoort draagt;
- geen zware voorwerpen tilt;
- geen buikspieroefeningen doet;
- uw buik ondersteunt als u moet hoesten of niezen.

## Doorgaan met Lactulose stroop en Bactroban® neuszalf

Het is belangrijk dat u na de operatie door blijft gaan met de lactulose stroop en de Bactroban neuszalf. De PD-verpleegkundige of uw arts vertellen u als u daarmee weer mag stoppen.

## Niet douchen

U mag de eerste 2 weken na de katheterimplantatie niet douchen of in bad. Dit omdat u hiermee de kans op een ontsteking verhoogt.

## Katheter nog niet zelf verzorgen

Het is belangrijk dat de katheter in dezelfde positie afgeplakt blijft. Daarom mag u de katheter nog niet zelf verzorgen. U hoort van de

PD-verpleegkundige wanneer u dit wel zelf mag gaan doen.

## Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u de eerste 24 uur na de katheterimplantatie last van flink nabloeden, koorts (vanaf 37.5°C), obstipatie of pijn in uw buik of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoor tijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoor tijden belt u verpleegafdeling A8 Noord, telefoonnummer (073) 553 20 31.

Bij vragen of problemen ná 24 uur belt u naar de PD-verpleegkundige, telefoonnummer (073) 553 77 46.

## Controle

Wanneer komt u op controle?

- Het verband op de wondjes van de operatie en de huidpoort blijven 1 week zitten.
- 1 week na de operatie heeft u een controle afspraak bij de PD-verpleegkundige. De afspraak hiervoor krijgt u mee bij uw ontslag uit het ziekenhuis. De PD-verpleegkundige controleert dan de huidpoort en verbindt deze opnieuw.
- Zo nodig komt u meerdere keren op controle, bijvoorbeeld als het verband doorlekt. Neem dan contact op met de PD-afdeling. U moet de wondjes en huidpoort dan opnieuw laten verbinden op de PD-afdeling.

## Vragen

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of problemen die te maken hebben met peritoneaal dialyse, kunt u altijd contact opnemen met de PD-verpleegkundigen.

- Op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 20.30 uur, telefoonnummer: (073) 553 77 46.
- Op zaterdag van 8.00 uur tot 20.30 uur, telefoonnummer: (073) 553 77 44.
- Op maandag t/m zaterdag na 20.30 uur en op zondag belt u naar het centrale nummer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, telefoonnummer: (073) 553 20 00. Bij medische problemen vraagt u naar de dienstdoende assistent van Interne Geneeskunde. Bij alle andere problemen vraagt u naar de bereikbare B dienst van het Dialysecentrum.

## Praktische tips

### Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

- een geldig identiteitsbewijs
- uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee>) over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aanmelden>) hoe dit werkt.

### Bekijk uw zorgverzekering

Controleer zelf vóór een afspraak in het JBZ of uw zorg wordt vergoed:

- Bekijk hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tarieven>) met welke zorgverzekeraars het JBZ een contract heeft.
- Het hangt ook af van uw polis of uw zorgverzekeraar alle zorg volledig vergoedt.

- Onze zorg valt voor volwassenen onder het wettelijk eigen risico. Dit betekent dat u ieder jaar eerst een bedrag zelf moet betalen, voordat uw zorgverzekeraar kosten gaat vergoeden.

## MijnJBZ

Via MijnJBZ (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz>) kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien?

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz/wat-kan-ik-in-mijnjbz-zien>)

## Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen>) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

## Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak>). Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

# Betrokken afdelingen

Chirurgie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/chirurgie>)

Dialysecentrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/dialysecentrum>)

Code DIA-041