

Behandeling

Borstoperatie bij borstkanker

In verreweg de meeste gevallen begint de behandeling van borstkanker met een operatie. De tumor wordt hierbij operatief verwijderd.

Er zijn twee operaties mogelijk bij borstkanker:

- Borstsparende operatie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/borstsparende-operatie>)
- Borstamputatie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/borstamputatie>)

Voor welke operatie gekozen wordt, hangt af van de grootte van de tumor en de borst, de soort borstkanker en in hoeverre de kanker verspreid is. Ook uw voorkeur telt uiteraard mee in de beslissing.

Borstkanker kan uitzaaiingen geven. Meestal verspreidt borstkanker zich het eerst naar de lymfeklieren in de oksel (okselklieren).

Soms moeten deze klieren daarom verwijderd worden. Dit heet een okselklierdissectie

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/okselklierdissectie-okd>).

Als er geen sprake is van voelbare lymfeklieren, verwijdert de chirurg een 'schildwachtklier'. Dit is een lymfeklier in de oksel die zich het dichtst bij de afwijking in de borst bevindt. Dit is de zogenoemde schildwachtklierprocedure

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/schildwachtklierprocedure-bij-een-voorloopstadium-van-borstkanker>).

Na een borstoperatie krijgt u leefregels en oefeningen

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/oefeningen-en-regels-na-een-borstoperatie>) mee.

Betrokken afdelingen

Borstcentrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/borstcentrum>)

Chirurgie bij kanker (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/chirurgie-bij-kanker>)