

Aandoening

Buigpeesletsel

Buigpeesletsel wordt veroorzaakt door een diepe verwonding of snee aan de binnenzijde van de onderarm, de hand of de vingers.

Buigpezen zijn pezen die lopen aan de binnenzijde van de hand en arm. Met deze pezen kunt u uw vinger en pols buigen. Meestal is de verwonding bij buigpeesletsel duidelijk zichtbaar. Heel soms kan er na een klein ongeval ook 'gesloten buigpeesletsel' optreden. Hierbij is er aan de buitenkant niks te zien. De huid blijft intact en de (diepe) buigpees scheurt af daar waar het vastzit aan het bot.

Onderzoeken

Een handonderzoek is nodig om te bepalen welke buigpezen beschadigd zijn.

Behandelingen

De plastisch chirurg kan buigpeesletsel herstellen met een operatie. Daarna is revalidatie bij de handtherapeut nodig.

Buigpeesoperatie

Als de buigpezen in uw vinger of hand zijn doorgesneden, kan de plastisch chirurg dit herstellen.

Tijdens de operatie hecht de plastisch chirurg de uiteinden van de buigpezen aan elkaar. Vaak moet de plastisch chirurg de aanwezige wond iets groter maken om de peesuiteinden op te zoeken en te hechten. In de folder 'Buigpeesoperatie' leest u meer over deze behandeling.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/buigpeesoperatie>

Poliklinieken en afdelingen

Plastische Chirurgie

Plastisch chirurgen voeren operaties uit om de vorm of de functie van een lichaamsdeel te herstellen.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/plastische-chirurgie>

Hand en Pols Expertisecentrum

Het Hand-Pols Expertise Centrum (HPEC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gespecialiseerd in hand- en polschirurgie. Patiënten met ingewikkelde hand- en polsproblemen kunnen hier terecht.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hand-en-pols-expertisecentrum>

Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug)

Tolbrug is hét regionale expertisecentrum voor revalidatie in noordoost Brabant.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-revalidatiegeneeskunde>