Aandoening

Hepatitis B

Hepatitis B is een virale ontsteking van de lever. De ontsteking wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. U kunt dit virus krijgen door contact met bloed, onveilige seks. Ook kan een moeder het virus tijdens de geboorte aan haar kind overdragen.

Acute hepatitis B

Bij ongeveer 90% van de volwassenen geneest de infectie binnen 6 maanden vanzelf. Het lichaam maakt dan antistoffen aan die levenslang beschermen tegen het hepatitis B-virus.

Chronische hepatitis B

Als het hepatitis B-virus langer dan 6 maanden in het bloed blijft, dan is er sprake van een chronisch infectie. Dit gebeurt bij ongeveer 5 tot 10% van de volwassenen en bij 90% van de besmette baby's.

Chronische hepatitis B kan actief of niet actief zijn. Bij een actieve infectie blijft de lever ontstoken. Hierdoor kan op de lange termijn littekenweefsel in de lever (leverfibrose), levercirrose of leverkanker ontstaan.

Hepatitis behandelcentrum

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een officieel gecertificeerd Hepatitis behandelcentrum (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hepatitis-behandelcentrum). Wij behandelen hier patiënten met een virale hepatitis, zoals hepatitis B en hepatitis C.

Meer informatie? Kijk op de website van de Maag-, Lever-, Darmstichting. (https://www.mlds.nl/ziekten/hepatitis-b/)

Onderzoeken

Door bloed bij u af te nemen, kan de arts zien of u besmet bent met het hepatitis B virus.

Voordat de behandeling kan starten, onderzoekt de arts hoe ernstig de ontsteking is en of uw lever beschadigd is. Hiervoor krijgt u extra onderzoeken.

Echo-onderzoek van de buik (echografie abdomen)

Met een echo van de buik kan de radioloog of laborant de organen en bloedvaten in uw buik met geluidsgolven (echo) onderzoeken.

De radioloog beweegt met een klein apparaat (transducer) over het te onderzoeken lichaamsdeel. De transducer zendt geluidsgolven uit en vangt deze ook weer op. Het echoapparaat zet deze om tot een beeld.

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.

Krijgt uw kind een echo-onderzoek van de buik? Lees dan de folder Echo-onderzoek van de buik bij kinderen (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/echo-onderzoek-van-de-buik-bij-kinderen).

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/echo-onderzoek-van-de-buik-echografie-abdomen

Fibroscan van de lever

Bij een fibroscan van de lever meten we hoe soepel of stevig uw lever is.

De arts kan bij dit onderzoek zien of er littekenweefsel (fibrose) in uw lever zit, en zo ja hoeveel. Door fibrose kan de lever slechter gaan werken. Bij ernstige fibrose kan de lever kleiner worden. Dit heet cirrose. Als bekend is hoeveel fibrose er in uw lever zit, kan de arts beter bepalen welke behandeling u nodig heeft. De fibroscan wordt meestal gedaan bij patiënten met chronische hepatitis B en C. Dit onderzoek kan ook bij andere chronische leverziektes worden gedaan.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/fibroscan-van-de-lever

Bloedonderzoek

Bij bloedonderzoek nemen we 1 of meer buisjes bloed af met een hol naaldje. Dit bloed wordt in het laboratorium onderzocht.

Bloedonderzoek of onderzoek van urine of ontlasting is nodig als uw arts meer wil weten over:

- uw gezondheid;
- het verloop van uw ziekte;
- het resultaat van een behandeling.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/bloedonderzoek

Punctie van een buikorgaan of long met een echo

Bij een punctie wordt met een naald een stukje weefsel uit het lichaam gehaald, om dit weefsel verder te kunnen onderzoeken in het laboratorium.

Eerst zoekt de radioloog de plaats van de afwijking op met een echo-apparaat. Hierna prikt de radioloog met een speciale naald in het orgaan en haalt hiermee één of meerdere stukjes weefsel weg. Dit weefsel onderzoeken we in het laboratorium.

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/punctie-van-een-buikorgaan-of-long-met-een-echo

Behandelingen

Acute hepatitis B geneest bijna altijd vanzelf. Behandeling met medicijnen is niet nodig.

Gezonde voeding en leefstijl helpen bij de genezing. U kunt beter geen alcohol drinken.

Chronische Hepatitis B

Er zijn verschillende medicijnen om hepatitis B te behandelen. Door de behandeling wordt de kans op blijvende schade aan de lever veel kleiner.

Uw arts beoordeelt of u een behandeling nodig heeft en welke behandeling het beste bij u past. Dit hangt vooral af van hoe actief de ontsteking is en hoeveel schade er aan uw lever is ontstaan. De arts kijkt hiervoor onder andere naar ernst van de ontsteking en naar de uitslagen van uw bloedonderzoek.

Poliklinieken en afdelingen

Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

Het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) richt zich op de diagnostiek en behandeling van ziekten van het spijsverteringskanaal.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/maag-darm-en-leverziekten-mdl

Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie

De internist houdt zich bezig met ziekten van de inwendige organen.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/algemene-interne-geneeskunde-en-endocrinologie

Hepatitis Behandelcentrum

Het Hepatitis Behandelcentrum is bedoeld voor patiënten met een virale hepatitis, zoals hepatitis B (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hepatitis-b#mainmenu) en hepatitis C (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hepatitis-c). Het Hepatitis Behandelcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is officieel gecertificeerd.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/hepatitis-behandelcentrum

Code INT-236

Copyright 2026 Jeroen Bosch Ziekenhuis