

Aandoening

Plotseling gehoorverlies

Bij plotselinge gehoorverlies verslechtert uw gehoor in korte tijd.

Het gehoorverlies ontstaat meestal binnen enkele seconden tot minuten. Het geluid klinkt ineens doffer, blikkeriger, vervormd of heeft een echo. Soms hoort het oor helemaal niets meer. Meestal treedt het gehoorverlies aan één oor op. Als het gehoorverlies aan één oor optreedt, kunt u niet meer aangeven van welke kant het geluid komt.

Het plotselinge verlies van het gehoor aan één of beide zijden is ingrijpend. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis probeert u daar zo goed mogelijk bij te begeleiden.

Meer informatie? Kijk op KNO.nl. (<https://www.kno.nl/patienten-informatie/oor/plotselinge-doofheid/>)

Onderzoeken

Gehoioronderzoek

Met dit onderzoek kan de KNO-arts nagegaan of uw gehoorklachten te maken hebben met een stoornis van het gehoororgaan.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/gehoioronderzoek>

MRI onderzoek algemeen

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Bij een MRI-onderzoek worden met behulp van sterke magneetvelden en radiogolven foto's gemaakt van organen en weefsels in het lichaam.

Een MRA-onderzoek is een MRI van de bloedvaten. Veelal wordt hierbij contrastvloeistof toegediend via een infuus.

U leest hier algemene informatie over het onderzoek. Uw persoonlijke situatie kan soms anders zijn dan hier beschreven.

LET OP!

- U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 3 DAGEN vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.
- We vragen u om ruim van tevoren de vragenlijst in te vullen. Heeft u één of meer vragen met JA beantwoord? Neem dan contact op met afdeling Radiologie.

In dit filmpje kunt u zien hoe u zich op een MRI-onderzoek moet voorbereiden en hoe het onderzoek verloopt.

Bekijk de video op de website (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/>).

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/mri-onderzoek-algemeen>

Behandelingen

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van uw plotselinge doofheid. Als we geen oorzaak kunnen vinden, dan kunnen ontstekingsremmende geneesmiddelen het oor soms helpen herstellen. Dit geneesmiddel moet binnen twee weken na het opreden van de plots-doofheid gestart worden. Na deze periode is de behandeling niet zinvol meer. We wachten dan het spontane herstel af. Soms kan een hoortoestel helpen.

Injectie in het middenoor bij plotseling gehoorverlies

Bij plotseling gehoorverlies verslechtert het gehoor in korte tijd. De KNO-arts geeft een injectie in het middenoor om verder gehoorverlies tegen te gaan.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/injectie-in-het-middenoor-bij-plotseling-gehoorverlies>

Poliklinieken en afdelingen

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

De keel-, neus- en oorarts (kno-arts) houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/keel-neus-en-oorheelkunde-kno>

Code KNO-751