

Behandeling

Buikvliesontsteking (peritonitis) bij dialyse

Peritonitis is een ontsteking van het buikvlies. We behandelen dit met antibiotica in uw dialysevloeistof.

U bent vandaag gestart met een behandeling voor een buikvliesontsteking (peritonitis). U krijgt antibiotica via de PD-vloeistof. Hieronder leest u precies wat u de komende dagen moet doen.

(073) 553 77 46

Maandag t/m vrijdag 7.30 - 20.30 uur

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Belangrijke afspraken en aandachtspunten

- Binnen 24 uur krijgt u een nieuw verlengstukje aan uw PD-katheter. De PD-verpleegkundige maakt hiervoor met u een afspraak.
- De eerste PD-vloeistof met antibiotica moet 6 uur in uw buik blijven. Dit heet de 'inwerktijd'.
- Warm de vloeistof met daarin de antibiotica maximaal 1 tot 1,5 uur vóór gebruik op.
- Gebruikt u een APD-machine? Haal de vloeistofzak na het opbouwen van de warmhoudplaat van de plaat af. Spuit daarna pas de antibiotica in de zak.
- U krijgt een recept mee voor Nystatine (medicijn tegen schimmel). Neem dit 4 keer per dag in, zolang de behandeling voor de peritonitis duurt.
- Neem elke dag de eerste uitloop (de eerste afgevoerde zak) mee naar het ziekenhuis. Het laboratorium controleert hiermee of de ontsteking minder wordt. De PD-verpleegkundige vertelt u als dit niet meer nodig is.
- U komt elke dag naar het ziekenhuis om de CAPD-vloeistof met de daarin opgeloste antibiotica op te halen. Dit hoeft niet als u zelf de antibiotica in de zak mag/kan spuiten, of als de thuiszorg/wijkverpleging dit voor u gaat doen.
- Elke dag wegen en doorbellen. Door de ontsteking kan er minder uitloop zijn. U kunt dan in korte tijd zwaarder worden. Weeg uzelf daarom elke dag op hetzelfde tijdstip, en bel ons om uw gewicht door te geven. Zo nodig kunnen we dan uw spoelschema aanpassen.
- Verandert uw ontlastingspatroon (bijvoorbeeld vaker, dunner of juist verstopping)? Overleg dan met de PD-verpleegkundige wat u het beste kunt doen.
- Bij diabetes mellitus (suikerziekte) kan uw bloedsuiker schommelen, bij een ontsteking en bij gebruik van vloeistoffen met meer glucose. Controleer daarom elke dag uw bloedsuiker.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

Bel altijd naar de PD-verpleegkundige of de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde als uw klachten erger worden, bijvoorbeeld meer pijn of koorts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u bellen naar de PD-verpleegkundigen, telefoonnummer (073) 553 77 46.

Betrokken afdelingen

Dialysecentrum (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/dialysecentrum>)

Code DIA-068