

CENTRUM VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE

# U KRIJGT EEN BAARMOEDERFOTO(HSG)

## Afspraak

U kunt uw afspraak maken op cyclusdag .....

tot cyclusdag .....

Dag en datum: ..... dag .....

Tijd: ..... uur

Plaats: Afdeling Radiologie, gebouw B, verdieping 0, ontvangstbalie 4.

**Meldt u zich 10 minuten voor de afgesproken tijd aan de balie.**

## Waarom krijgt u een baarmoederfoto?

Zijn er bij de onderzoeken van de cyclus en het zaad geen afwijkingen gevonden? Dan kan de arts het onderzoek uitbreiden met het maken van een baarmoederfoto (hysterosalpingogram of HSG). Hierbij bekijkt de arts de vorm van de baarmoeder en of de eileiders open zijn. Krijgt u een inseminatiebehandeling? Dan wordt vooraf altijd eerst een baarmoederfoto gemaakt.

## Wanneer kunt u een afspraak maken?

De arts heeft aangegeven in welke periode van uw cyclus u het onderzoek kunt plannen. Bent u overgevoelig voor jodium? Geeft u dit dan meteen door bij het maken van de afspraak.

De foto kan maar in een korte periode van de cyclus gemaakt worden. Vanaf het moment dat u niet meer ongesteld bent, maar vóórdát de eisprong plaatsvindt. U mag namelijk niet zwanger zijn op het moment dat de baarmoederfoto wordt gemaakt. Het is van tevoren niet altijd zeker of het in een bepaalde cyclus kan gebeuren. U kunt bellen vanaf de eerste dag van uw menstruatie.



### **Hoe bereidt u zich voor?**

U heeft een recept gekregen voor een antibiotica en een zetpil tegen de pijn. U neemt op de avond vóór het maken van de foto de tabletten antibiotica tegelijkertijd in. Dit is om een ontsteking van de baarmoeder te voorkomen. Op de dag zelf kunt u 1 uur voor het maken van de foto de pijnstillers, diclofenac zetpil 100 mgr, zetten. De zetpil geeft soms aandrang voor ontlasting.

Na het onderzoek kunt u vaginaal wat bloed of contrastvloeistof verliezen. Neem daarom ook wat maandverband mee. Verder adviseren we u om niet alleen te komen en niet zelf naar huis te rijden.

### **Hoe maken we de foto?**

In de kleedkamer bij de onderzoekskamer kleedt u zich uit. Uw onderlichaam moet ontbloot worden, het bovenlichaam niet. Bij het maken van de baarmoederfoto is één van onze artsen en een radiologisch assistent(e) aanwezig.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De arts brengt een spreider in de vagina. De vagina en baarmoederhals worden gedesinfecteerd met een jodiumoplossing. De arts brengt een dun slangetje met daarin een klein ballonnetje door de baarmoedermond in de baarmoeder. Dit slangetje heet een ballonkatheter. Nadat het ballonnetje is opgepompt, spuit de arts een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in de baarmoeder.

Het inbrengen van het slangetje en inspuiten van de vloeistof kan krampen veroorzaken. Dit kunt u vergelijken met menstruatiepijn. Door de contrastvloeistof worden de vorm van de baarmoederholte en de doorgankelijkheid van de eileiders in beeld gebracht. Hier worden foto's van gemaakt.

Het is mogelijk dat een korte tijd later nog een controlefoto wordt gemaakt. Hierna bespreekt de arts kort de voorlopige uitslag met u. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Uw partner mag bij het onderzoek aanwezig zijn. Hij krijgt dan een loden schort aan vanwege de röntgenstraling. Uw partner kan ook achter de loden afscherming gaan staan.

### **Na het onderzoek**

Na het onderzoek kunt u tijdelijk nog wat buikpijn houden. Ook kan er uit de vagina nog wat bloed, jodium of contrastvloeistof komen.

### **Wanneer hoort u de uitslag?**

De uitslag krijgt u tijdens het evaluatiegesprek. U maakt hiervoor een afspraak bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde. De arts geeft u advies en bespreekt het verdere behandelplan met u.

Zijn er afwijkingen op de foto te zien, dan overleggen we met u wat de volgende stap is. Wanneer één van de eileiders niet zichtbaar was op de foto, kan dit betekenen dat deze eileider echt is afgesloten. Het kan ook zijn dat de eileider even verkramp was als reactie op het onderzoek. In beide gevallen laat de eileider geen contrastvloeistof door en wordt hij niet zichtbaar op de foto.

Om onderscheid te maken tussen deze mogelijke oorzaken kan de arts een kijkoperatie voorstellen. Hierbij kan de arts de baarmoeder, eierstokken en eileiders goed bekijken.

#### **Wanneer belt u het ziekenhuis?**

Zeer zelden treedt er na het onderzoek een complicatie op. Dit kan een allergische reactie op de contrastvloeistof of een infectie zijn. Bij koorts (38°C of meer), heftige buikpijn of veel bloedverlies belt u het ziekenhuis.

#### **Heeft u nog vragen?**

Dan kunt u via de digitale kinderwenspoli uw vraag stellen aan de verpleegkundige. U kunt ook bellen naar de verpleegkundige Voortplantingsgeneeskunde tijdens het telefonisch spreekuur van 11.00 uur tot 12.00 uur en tussen 13.30 uur tot 14.00 uur. Telefoonnummer: (073) 553 27 29.

U kunt ook bellen met de secretaresse Centrum Voortplantingsgeneeskunde. Telefoonnummer: (073) 553 86 60.

Voor meer informatie kijkt u op de website: [www.jbz.nl/voortplantingsgeneeskunde](http://www.jbz.nl/voortplantingsgeneeskunde)