

KINDERGENEESKUNDE

UW KIND KRIJGT EEN BEHANDELING MET INFLIXIMAB

Uw kind krijgt een behandeling met Infiximab. Remicade en Remsima zijn beide medicijnen met de werkzame stof Infiximab. Dit vermindert ontstekingen en gebruiken we bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Ook vermindert of stopt het fistels. Deze fistels zitten tussen de darm en de huid of andere organen.

Welke stof zit er in Infiximab?

De stof Tumor Necrose Factor Alpha (TNF) speelt een belangrijke rol bij chronische ontstekingen. Patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa hebben meer TNF in hun bloed en in de darmwand dan normaal. Infiximab bindt zich aan TNF in het bloed. Dit gebeurt ook in de cellen waar de stof wordt gemaakt. Infiximab zorgt ervoor dat het TNF niet meer werkt. Op deze manier stopt de ontsteking.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Voor de behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Maar u en uw kind kunnen zich wel voorbereiden op de opname in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Dit kan via de kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl.

Is uw kind ziek, griep of koorts? Bel dan een dag voor de afgesproken datum naar de Verpleegkundig Specialist Kinder MDL of de Kinder MDL-arts om te overleggen of het infuus door kan gaan.

Meer informatie over de afdeling Kinderdagbehandeling leest u in de brochure 'Informatie Onderzoek Kinderdagbehandeling' (KIN-033).

Hoe verloopt de opname?

Wanneer uw kind wordt opgenomen, vult u op de afdeling eerst een vragenlijst in. De kinderarts kijkt deze gegevens na en beslist of de behandeling door mag gaan. Als het nodig is dat de kinderarts u van tevoren nog spreekt, nemen we contact met u op.



Infliximab via infuus

Uw kind wordt voor een dagdeel opgenomen op de Kinderdagbehandeling. Daar krijgt uw kind een infuus in de arm. Als het infuus in de arm zit, wordt er eerst bloed afgenomen. Daarna krijgt uw kind via het infuus de Infliximab. Dit duurt ongeveer twee tot drie uur. Op het moment dat het infuus in de arm zit, moet uw kind op de afdeling blijven.

Op de website: www.halloziekenhuis.nl kan uw kind een filmpje bekijken over het inbrengen van het infuus.

Wanneer mag u kind naar huis?

Als uw kind de Infliximab krijgt, controleren we de bloeddruk, pols en temperatuur. Heeft uw kind geen klachten, dan mag uw kind direct na het inlopen van het infuus naar huis. Heeft uw kind klachten van een allergische reactie? Dan blijft uw kind 1 tot 2 uur langer op de afdeling. Dit is afhankelijk van de klachten die uw kind heeft.

De eerste 2 keren dat uw kind een infuus krijgt, moet uw kind minimaal 1 uur blijven.

Hoeveel Infliximab krijgt uw kind?

De kinderarts beslist over de hoeveelheid Infliximab die uw kind krijgt. De arts bepaalt dit aan de hand van de ziekte van uw kind, het gewicht en hoe het op Infliximab reageert. Ook bepaalt de kinderarts hoeveel tijd er tussen twee doseringen moet zitten. Dit noemen we de dosisinterval.

Welke risico's kunnen er zijn?

Infliximab kan bijwerkingen hebben. Net als andere medicijnen. Infliximab heeft geen ernstige bijwerkingen. De bijwerkingen kunnen tot zes maanden na de laatste toediening optreden.

De twee belangrijke soorten bijwerkingen van Infliximab zijn:

- allergische reacties tegen het middel;
- klachten die ontstaan doordat het immuunsysteem minder goed werkt.

Allergische reacties

Allergische reacties ontstaan meestal binnen twee uur nadat kinderen het infuus hebben gekregen. Reacties die het meest voorkomen:

- huiduitslag of netelroos;
- vermoeidheid;
- problemen met ademen zoals benauwdheid en piepende ademhaling;
- daling van de bloeddruk.

Ziet u één van deze reacties? Waarschuw dan een arts of een verpleegkundige. De arts kan het infuus stoppen of langzamer laten lopen. Soms moeten we de klachten behandelen met andere medicijnen. We hoeven bijna nooit de behandeling met Infliximab te stoppen.

Verminderde werking immuunsysteem

Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen indringers van buiten. Wanneer het immuunsysteem minder goed werkt, kunnen er infecties ontstaan. Een voorbeeld van zo'n infectie is tuberculose. Uw kind kan tuberculose hebben zonder dat u het weet. Wanneer uw kind Infliximab krijgt, kan tuberculose actief worden.

Daarom is het heel belangrijk dat u vertelt of uw kind ooit tuberculose heeft gehad of in contact is geweest met iemand die tuberculose heeft gehad. Vertel ons ook of dat er in uw regio tuberculose voorkomt. Uw kind kan mogelijk besmet zijn geraakt.

Wanneer uw kind een wond of problemen met het gebit heeft, moet u dit ook melden. Meld het ook als uw kind koorts heeft.

Krijgt uw kind een operatie of een ingreep van de tandarts? Geef dan aan de behandelend arts door dat uw kind Infiximab gebruikt.

Wanneer belt u direct het ziekenhuis?

U belt als uw kind de volgende bijwerkingen heeft:

- pijn of zwakte in de borst, spieren, gewrichten of kaken;
- gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel, waardoor ademen of slikken moeilijk wordt;
- netelroos of andere tekenen van allergische reactie;
- koorts;
- huiduitslag/jeuk;
- kortademigheid tijdens inspanning of wanneer uw kind gaat liggen.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04. Buiten kantooruren belt u naar de Kinderafdeling, telefoonnummer: (073) 553 25 27. U vraagt dan naar de dienstdoende kinderarts.

Wanneer komt uw kind terug voor controle?

Eén keer in de drie maanden wordt uw kind opgeroepen voor het IBD-spreekuur. IBD is de verzamelnaam voor chronische darmziekten. Het IBD-spreekuur is een spreekuur waar uw kind een kinder MDL-arts, de diëtist en de Verpleegkundig Specialist Kinder MDL ziet.

De secretaresse maakt voor u een afspraak voor dit IBD-spreekuur.

Kunt u niet naar de afspraak komen?

Geeft u dit dan tenminste 24 uur van tevoren door aan de afdeling Kinderdagbehandeling. We kunnen dan een ander kind helpen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u bellen naar Verpleegkundig Specialist Kinder MDL.

Telefoonnummer: (073) 553 23 44. Als zij niet aanwezig is, belt u naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.

U kunt uw vraag ook e-mailen naar: kinderIBD@jbz.nl.

Voor meer informatie kijkt u op onze website: www.jbz.nl

Bronvermelding: Delen van deze tekst hebben we met toestemming overgenomen uit de registratietekst van Infiximab.