



KINDERGENEESKUNDE

Midazolam bij een epileptische aanval of koortsstuip bij kinderen

Het medicijn midazolam (Dormicum®) schrijven we voor bij kinderen die 1 of meer koortsstuipen of epileptische aanvallen hebben gehad. Dit medicijn kan een nieuwe aanval stoppen.

Hoe stopt u een epileptische aanval of koortsstuip?

Een aanval gaat meestal vanzelf over. Toch is het soms nodig om een medicijn te geven om de aanval te stoppen. Dit medicijn kunt u zelf geven aan uw kind, in de vorm van een neusspray.

Afspraken met de arts

De arts spreekt met u af wanneer en hoeveel midazolam neusspray u mag geven.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hoe geeft u de neusspray?

U sprayt de midazolam in 1 of beide neusgaten. Midazolam neusspray wordt door het neusslijmvlies opgenomen en komt zo in de bloedbaan terecht.

1. Houd het flesje rechtop en spray een keer in de lucht.
2. U moet het flesje ook rechtop houden als u sprayt. Dat betekent dat u het hoofd en de romp van uw kind iets op moet tillen.
3. Spray daarna het voorgeschreven aantal pufjes in de neusgaten van uw kind. Verdeel de sprays over beide neusgaten. Bij 2 pufjes sprayt u in ieder neusgat 1 keer. Bij 4 pufjes sprayt u in ieder neusgat 2 keer.
4. Onthoud het tijdstip waarop u de midazolam heeft gegeven.

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© Jeroen Bosch Ziekenhuis

