

BOSENTAN

TRACLEER®

Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: bosentan.

Hoe werkt bosentan?

Bosentan behoort tot de groep endotheline-receptor blokkers (endotheline receptor antagonist). Deze medicijnen remmen de werking van endotheline, een hormoon dat zorgt voor vernauwing van de bloedvaten. Bosentan is dus een bloedvatverwijder. Deze bloedvatverwijding zorgt bijvoorbeeld in de longslagader voor een daling van de bloeddruk en zorgt in de handen en voeten voor een betere bloeddorstrooming. Meestal duurt het één tot drie maanden voordat beoordeeld kan worden of bosentan werkt.

Voor welke aandoeningen wordt bosentan gebruikt?

Bosentan wordt voorgeschreven bij pulmonale arteriële hypertensie (PAH) en bij niet of slecht genezende wondjes (ulcera) aan handen/voeten.

PAH kan door verschillende ziekten worden veroorzaakt onder andere reumatische auto-immuunziekten zoals systemische sclerose. Bij patiënten met PAH is er sprake van een te hoge bloeddruk in de longslagader. In de longslagader stroomt bloed afkomstig vanuit het hart naar de longen toe. Wanneer de druk in de longslagader verhoogd is, zal het hart dus harder moeten werken. Dit kan klachten veroorzaken als kortademigheid, vermoeidheid, flauwvallen, pijn op de borst en vocht vasthouden in de benen. Bosentan is een bloedvatverwijder en verlaagt de bloeddruk in de longslagader.

Bosentan wordt ook voorgeschreven aan patiënten met niet of slecht genezende wondjes aan handen/voeten in het kader van onder andere reumatische auto-immuunziekten zoals systemische sclerose. Bosentan kan ook het ontstaan van nieuwe wondjes voorkomen.



Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© Jeroen Bosch Ziekenhuis 2017 www.jeroenboschziekenhuis.nl

(REU-078, uitgave april 2017)

Hoe moet ik het gebruiken?

Bosentan is beschikbaar in de vorm van tabletten. Bosentan wordt twee keer per dag gebruikt in de vorm van tabletten van 62,5 of 125 mg. De begin dosering is twee keer per dag 62,5 mg. Na vier weken wordt de dosis meestal verhoogd naar twee keer per dag 125 mg.

Uw behandelaar spreekt met u af hoeveel tabletten u moet gaan gebruiken

Hoe moet bosentan bewaard worden?

Bosentan moet droog bewaard worden op kamertemperatuur.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn.

- Hoofdpijn, duizeligheid en blozen. Deze bijwerkingen zijn een gevolg van het wijder worden van de bloedvaten. Dit verdwijnt meestal na enkele weken gebruik wanneer het lichaam aan het medicijn gewend is.
- Vasthouden van vocht waardoor u zwelling van de enkels/onderbenen of handen kunt krijgen.
- Hartkloppingen
- Levertest afwijkingen
- Maag-darm klachten zoals misselijkheid en diarree
- Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Zijn er controles noodzakelijk tijdens het gebruik van bosentan?

Na het starten van bosentan zal uw behandelaar laboratoriumcontroles (bloedprikken) met u afspreken. Dit zal in het begin regelmatig nodig zijn om in de gaten te houden hoe uw lichaam op het medicijn reageert. Zo nodig wordt de dosis bosentan aangepast. Als er stoornissen in het bloed optreden, dan zijn die in het algemeen van voorbijgaande aard.

Bij verandering van de dosering zult u mogelijk extra gecontroleerd worden.

Kan het gebruikt worden met andere medicijnen?

Bosentan mag met sommige medicijnen niet zomaar gecombineerd worden. Bepaalde medicijnen kunnen bij gelijktijdig gebruik de bloedspiegels van bosentan en/of sommige bijwerkingen beïnvloeden. Ook kan bosentan de werking en bijwerkingen van andere medicijnen beïnvloeden. Meld daarom altijd bij uw behandelaar van dat moment dat u met bosentan behandeld wordt. Overleg met uw eigen behandelaar bij verandering van uw medicatie gebruik.

Voorzichtigheid is geboden bij de combinatie met fluconazol, rifampicine, ritonavir, simvastatine, tacrolimus of sirolimus. Bosentan mag niet gecombineerd worden met ciclosporine A of glibenclamide. Bosentan kan de betrouwbaarheid van de 'pil' verminderen.

Wat moet u nog meer weten?

Alcohol

In combinatie met bosentan wordt het risico op leverfunctiestoornissen verhoogd. Overleg met uw eigen behandelaar of gebruik van alcohol met mate is toegestaan.

Autorijden

Als bosentan leidt tot duizeligheid dan mag u niet autorijden.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Wij adviseren om uw (tand)arts te melden dat u bosentan gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Overleg met uw behandelaar of en hoe u mag reizen. Denk eraan om tijdig een medicatie paspoort bij uw apotheek aan te vragen dat u meeneemt op reis.

Vaccinaties

Bij een reumatische ziekte adviseren wij om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts. Heeft u een vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog of huisarts.

Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding

Van bosentan is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt.

Bosentan vermindert de betrouwbaarheid van de 'pil' daarom adviseren we u altijd aanvullende voorbehoedsmaatregelen te nemen. Als u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent, adviseren wij u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Bosentan kan namelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Het advies is om tijdens de behandeling met bosentan voor een betrouwbare anticonceptie te zorgen en voor start van het medicijn een zwangerschap uit te sluiten. U mag geen borstvoeding geven als u bosentan gebruikt.