

LONGGENEESKUNDE

INFLIXIMAB (INFLECTRA®, REMICADE®, REMSIMA®)

BIJ SARCOÏDOSE

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van infliximab. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn. U krijgt ook informatie wat u kunt doen als u last heeft van bijwerkingen. Lees naast deze folder ook de bijsluiter van het medicijn.

Hoe werkt infliximab?

Bij een auto-immuunziekte zoals sarcoïdose is er een fout in het afweersysteem ontstaan. Daardoor er sprake is van afweerreactie tegen het eigen lichaam. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Sarcoïdosepatiënten produceren te veel TNF (Tumor Necrosis Factor). Bij sarcoïdose uit dit zich in een ophoping van ontstekingscellen. Deze noemen we granulomen. Infliximab is een is een medicijn dat het eiwit TNF remt, waardoor het deze afweerreactie onderdrukt.

Effect

U moet infliximab ongeveer 6 tot 12 weken gebruiken, voordat u het effect ervan merkt. Soms duurt het echter langer. Bij sommige mensen werkt het medicijn niet of helaas onvoldoende.

Wanneer wordt infliximab gebruikt?

Artsen gebruiken infliximab bij de behandeling van verschillende auto-immuunaandoeningen. Dit medicijn wordt ook gebruikt bij sarcoïdose, reumatoïde artritis, artritis psoriatica, de ziekte van Bechterew en bij patiënten met psoriasis of ontstekingsziekten van de darm.

Hoe gebruikt u infliximab?

- De verpleegkundige geeft u infliximab via een infuus. Dit gebeurt op de afdeling Dagbehandeling.



Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl

(LON-097, uitgave juni 2018)

- De normale dosering is 5 mg per kilogram lichaamsgewicht. De dosering kan per diagnose verschillen. Uw arts spreekt dit met u af.
- Na het eerste infuus krijgt u na 2 en 6 weken opnieuw een infuus met infliximab.
- Daarna krijgt u elke 4 weken een infuus.
- De eerste keer dat u infliximab krijgt, duurt het toedienen van het medicijn via het infuus ongeveer 4 uur. Daarna krijgt u nog 2 uur een infuus met een zoutoplossing om na te spoelen.
- Tijdens de volgende afspraken duurt het toedienen van het medicijn via het infuus 3 uur en het naspoelen 1 uur.

Als uw ziekte rustig is, kan uw longarts besluiten om de dosering te verlagen. De tijd tussen de infusen kan bijvoorbeeld langer zijn. De arts kan de behandeling met infliximab soms zelfs stoppen.

Wat bijwerkingen kunnen voorkomen?

In de bijsluiters van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder staan de belangrijkste bijwerkingen die kunnen voorkomen. Deze komen minder dan 15% voor.

- Virale infecties zoals als neusverkoudheid en buikpijn komen regelmatig voor.
- U heeft een licht verhoogde kans op bepaalde vormen van huidkanker die meestal goed te behandelen zijn.
- Zeer zelden ontstaat tijdens een behandeling met infliximab een andere auto-immuunziekte, zoals multiple sclerose (MS) of systemische lupus erythematosus (SLE). Meld tintelingen, krachtsverlies of slechter zien aan uw arts.
- Omdat infliximab ervoor zorgt dat uw afweersysteem minder goed zijn werk kan doen, heeft u meer kans op infecties.
 - Heeft u een gewone verkoudheid zonder koorts, dan kunt u infliximab gewoon door blijven gebruiken.
 - Heeft u klachten die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts, koude rillingen, ziek voelen? Dan mag u infliximab niet gebruiken. Neem in dat geval ook altijd contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.

Wat gebeurt er als u klachten krijgt?

Terwijl u het infuus krijgt kunt u een overgevoeligheidsreactie krijgen. Als dat gebeurt dan stopt de verpleegkundige het infuus of laat dit langzamer inlopen. Soms krijgt u van uw longarts medicijnen om deze reactie te behandelen of te onderdrukken. Afhankelijk van hoe ernstig u reageert op het medicijn kan uw arts besluiten om de behandeling met infliximab definitief te stoppen.

Later optreden van een overgevoeligheidsreactie

Een allergie of overgevoeligheidsreactie op infliximab kan ook pas later optreden. Krijgt u nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten? Neem dan direct contact op met uw huisarts en/of uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Wanneer moet u contact opnemen?

Heeft u één of meerdere van bovengenoemde bijwerkingen en gaan deze niet over? Neemt u dan contact op met de verpleegkundig specialist of longarts. Vooral bij koorts (> 38.5 °C), infecties of als er spontaan blauwe plekken, gelige huidskleur, jeuk of bloedneuzen ontstaan is het belangrijk dat u direct contact opneemt.

Waarom krijgt u controles tijdens het gebruik van infliximab?

- Voordat de behandeling met infliximab start controleren we of u in het verleden in contact bent geweest met tuberculose (TBC). Dit gebeurt met een huidtest (Mantoux), een bloedtest en een röntgenfoto van de longen. Als u eerder TBC heeft gehad kan de ziekte weer opvlammen tijdens de behandeling met medicijnen zoals infliximab. Om dit te voorkomen kan uw arts u medicijnen geven tegen TBC.
- Het kan ook zijn dat de arts laat onderzoeken of u hepatitis B heeft. Hepatitis B is een virale infectie van de lever. Net als bij TBC kan het hepatitis virus door de behandeling opnieuw geactiveerd worden.
- Voor iedere volgende behandeling met infliximab worden uw bloedwaarden gecontroleerd. U heeft ook een afspraak met uw arts of verpleegkundig specialist op de polikliniek.

Waar moet u op letten bij het gebruik van infliximab?

Kunt u infliximab samen met andere medicijnen gebruiken?

Uw arts kan infliximab soms tegelijk met andere medicijnen voor sarcoïdose geven. Infliximab kan veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen, voor zover bekend. Overleg met uw arts als uw medicijn gebruik verandert.

Alcohol

U mag tijdens de behandeling met infliximab alcohol drinken. Gebruik niet meer dan 1 alcoholconsumptie per dag.

Autorijden

Infliximab kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom adviseren wij u dringend om niet zelf auto te gaan rijden op de dag van de behandeling. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen na de behandeling.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Als u infliximab gebruikt heeft u mogelijk een verhoogd risico op infecties na een operatie. Overleg met uw behandelend arts of het nodig is de infliximab tijdelijk te onderbreken. Wij adviseren om uw (tand)arts te melden dat u infliximab gebruikt. Die kan dan zo nodig maatregelen kan nemen.

Huidverzorging

Vermijd tijdens het gebruik van infliximab zonlicht en Uv-straling. Dit kunt u doen door beschermende kleding te dragen en/of zonnebrandcrèmes te gebruiken met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger). U kunt beter niet onder de zonnebank gaan.

Reizen

Neem als u naar het buitenland gaat een actueel overzicht van uw medicijnen mee. Dit medicatie paspoort kunt u bij uw eigen apotheek krijgen.

Vaccinaties

Omdat u een ernstige vorm van sarcoïdose heeft, adviseren we u om u jaarlijks de griepspuit te halen bij uw huisarts. Heeft u een andere vaccinatie dan voor de griep nodig? Overleg dan altijd van tevoren met uw behandelend arts, apotheek of huisarts.

Heeft u plannen om in de toekomst een verre reis te maken, bespreek dit dan met uw arts voordat u start met infliximab. Bij het geven van een vaccin reageert uw lichaam met een afweerreactie. Infliximab remt uw normale afweerreactie. Daardoor kan de vaccinatie minder goed werken. Tijdens het gebruik van infliximab mag u geen ver-

zwakte, levende vaccins toegediend krijgen, zoals de bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts of oraal poliovaccin of BCG.

Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding

Van infliximab is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Het lijkt zonder problemen tot aan de bevruchting gebruikt te kunnen worden. Heeft u plannen om in de nabije toekomst zwanger te worden of bent u onverwacht zwanger? Bespreek dit dan met uw arts. Overleg met uw arts of u tijdens het gebruik van infliximab veilig borstvoeding kunt geven.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over het gebruik van infliximab, stelt u die dan gerust aan uw longarts of verpleegkundig specialist. Ook wanneer u last heeft van bijwerkingen door het medicijn kunt u bij hen terecht.

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialist

Het telefonisch spreekuur van de verpleegkundig specialist is van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 11.00 uur. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (073) 553 23 55.

De verpleegkundig specialist is ook bereikbaar voor minder dringende vragen. U kunt hen een bericht sturen met een eConsult via mijnJBZ.nl.

Spoed

Heeft u dringende (lichamelijk) klachten die niet kunnen wachten tot het volgend telefonisch spreekuur? Dan kunt u tijdens werkdagen bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63. Zij kunnen u zo nodig doorverwijzen.

Buiten kantooruren, in het weekend en 's nachts kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00.

Afspraak met uw behandelend arts

Voor het maken van een afspraak met uw behandelend arts belt u naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.

Voor taxibriefjes en machtigingen kunt u contact opnemen met het secretariaat Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 15.