

4. ENDOCRINEBEHANDELING BUSELERINE

BIJ BORSTKANKER

Omdat de borstkanker hormoongevoelig is, heeft u samen met uw arts besloten dat u wordt behandeld met endocriene therapie in tabletvorm. Hierbij krijgt u ook endocriene therapie in de vorm van injecties, Buselerine. Buselerine wordt voorgeschreven bij vrouwen die nog niet in de overgang zijn (premenopauzaal).

Buselerine zorgt ervoor dat de oestrogeenproductie in de eierstokken tijdelijk wordt stilgelegd. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden.

Uw arts schrijft Buselerine voor samen met endocriene therapie, als aanvullend medicijn na een operatie van hormoongevoelige borstkanker. We spreken dan van een adjuvante behandeling. Daarnaast wordt Buselerine voorgeschreven bij vrouwen met borstkanker die niet meer te opereren is, of wanneer is aangetoond dat er al uitzaaiingen (metastasen) zijn, dus als palliatieve behandeling.

Hoe gebruikt u Buselerine?

U krijgt van uw huisarts of specialist één keer per drie maanden een injectie onder de huid.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Deze staan uitgewerkt in hoofdstuk 3

- Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
- Onvruchtbaarheid.
- Gewrichtsklachten.



- Osteoporose (botontkalking) en botbreuken.
- Misselijkheid.
- Trombose en hart- en vaatziekten.

Specifieke aandachtspunten

Over het algemeen wordt buselerine goed verdragen.

Wat moet u weten tijdens het gebruik van buselerine?

- Tijdens de eerste twee maanden van de behandeling is het belangrijk dat u nog extra maatregelen neemt om een zwangerschap te voorkomen.
- Neem bij vaginaal bloedverlies altijd contact op met uw arts.
- Zeker in het begin van de behandeling, hebben sommige vrouwen symptomen die ze ook kunnen hebben vlak voor hun normale menstruatie. Meestal gaat dit over als u doorgaat met de behandeling.
- Uw borsten kunnen pijnlijk of gespannen aanvoelen.
- Verandering in bloeddruk.
- U kunt last hebben van tintelende vingers of tenen.

Afspraken

Krijgt u last van bijwerkingen (uitgezonderd klachten die duiden op trombose of een longembolie)? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken aan te kijken als dat mogelijk is. Vaak verdwijnen de klachten na verloop van tijd weer als uw lichaam gewend is aan de behandeling.

Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen u tips geven over hoe u de hinder die u van bijwerkingen heeft kunt verminderen.

Heeft u (Medische) vragen tijdens kantooruren?

Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoonnummer **(073) 553 82 25**.

- Met medische vragen en/of zorgproblemen belt u bij voorkeur van maandag t/m vrijdag tussen **09.00 - 10.30 uur**. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
- Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen