

SUPPLEMENT INFORMATIEWIJZER ONCOLOGIE

4. ENDOCRIENE BEHANDELING LETROZOL

BIJ BORSTKANKER

Omdat de borstkanker hormoongevoelig is, heeft u samen met uw arts besloten dat u wordt behandeld met Letrozol. Letrozol wordt voorgeschreven bij vrouwen die al in de overgang zijn (postmenopauzaal).

Uw arts kan Letrozol voorschrijven als aanvullend medicijn na een operatie van hormoongevoelige borstkanker. We spreken dan van een adjuvante behandeling. Daarnaast kan Letrozol worden voorgeschreven bij vrouwen met borstkanker die niet meteen of niet meer te opereren is, of wanneer is aangetoond dat er al uitzaaiingen (metastasen) zijn, dus als palliatieve behandeling.

Na de menopauze maken de eierstokken geen oestrogeen meer aan. Op andere plaatsen in het lichaam wordt nog wel oestrogeen geproduceerd. Namelijk in het vetweefsel en in de bijnieren. Letrozol remt de aanmaak van oestrogeen op deze plekken. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden. Naast de kankercellen in de borst bereikt Letrozol ook eventuele kankercellen die in het bloed en/of de lymfbanen terecht zijn gekomen (om zich ergens anders in het lichaam te nestelen).

Letrozol werkt niet bij vrouwen die nog menstrueren. Bij deze vrouwen maken de eierstokken nog oestrogenen aan, en daar speelt het enzym geen rol.

Hoe gebruikt u Letrozol?

1 x daags 1 tablet à 2,5 mg. U neemt de tablet heel in met water. Doet u dat bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip van de dag.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Deze staan uitgewerkt in hoofdstuk 3.

- Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
- Onvruchtbaarheid.
- Gewrichtsklachten.
- Osteoporose (botontkalking) en botbreuken.
- Misselijkheid.
- Trombose en hart- en vaatziekten.

Specifieke aandachtspunten

Over het algemeen wordt Letrozol goed verdragen.

Wat moet u weten tijdens het gebruik van Letrozol?

- Neem bij vaginaal bloedverlies altijd contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.
- Bij het gebruik van Letrozol is er een groter risico op botontkalking.
- 30 tot 40% van de vrouwen die behandeld worden met Letrozol heeft last van (soms ernstige) bot- en gewrichtsklachten.
- Bij uitgezaaide borstkanker moet u Letrozol minimaal drie maanden gebruiken om te kunnen beoordelen of het medicijn werkt.
- Als u uitzaaiingen in de botten heeft, kan na het starten van de Letrozol de pijn in de botten tijdelijk erger worden en daarna pas weer verminderen. Dit betekent niet dat de behandeling niet aanslaat. Aanhoudende en toenemende pijn zijn echter wel redenen om contact op te nemen met uw arts of verpleegkundig specialist.

Afspraken

Krijgt u last krijgt van bijwerkingen (uitgezonderd klachten die duiden op trombose of een longembolie)? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken aan te kijken als dat mogelijk is. Vaak verdwijnen de klachten na verloop van tijd weer als uw lichaam gewend is aan de behandeling.

Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundig specialist. Zij kunnen u tips geven over hoe u de hinder die u van bijwerkingen heeft kunt verminderen.

Heeft u (Medische) vragen tijdens kantooruren?

Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoonnummer **(073) 553 82 25**.

- Met medische vragen en/of zorgproblemen belt u bij voorkeur van maandag t/m vrijdag tussen **09.00 - 10.30 uur**. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
- Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen