



KINDERGENEESKUNDE

## Diazepam bij een koortsstuij of een epileptische aanval bij kinderen

*Het medicijn diazepam (stesolid®) schrijven we voor bij kinderen die één of meer koortsstuijen of epileptische aanvallen hebben gehad. Dit medicijn kan een nieuwe aanval stoppen.*

### Hoe stopt u een epileptische aanval of koortsstuij?

Een aanval gaat meestal vanzelf over. Het verstijven of schokken stopt dan helemaal en uw kind kan weer rustig ademen. Toch is het soms nodig om een medicijn te geven om de aanval te stoppen. Dit medicijn kunt u zelf geven aan uw kind, in de vorm van een rectiole (ook wel klysma genoemd). Een rectiole is een tubetje met een vloeibaar medicijn, diazepam. U brengt de rectiole in het poepgaatje van uw kind en knijpt dan het tubetje leeg.

### Afspraken met de arts

De arts spreekt met u af wanneer u de rectiole mag geven. Het gaat vooral over hoeveel minuten na het begin van de aanval u de rectiole mag geven. De arts schrijft voor hoeveel u kind nodig heeft.

.....

.....

.....

.....

.....

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© Jeroen Bosch Ziekenhuis

### Hoe geeft u de rectiole?




Pak de rectiole en leg daarna uw kind op de zij. Is uw kind nog klein? Dan kunt u het beste uw kind op de buik over uw knie leggen. Houd de ademweg vrij en zorg dat speeksel uit de mond kan weglopen. Ontbloot de billen. Bij grotere kinderen is het prettig als u de privacy van uw kind beschermt door ervoor te zorgen dat omstanders de ontblote billen niet zien.



Haal de rectiole uit de verpakking. Houd deze met de punt omhoog, zodat de vloeistof er niet uitloopt als u de tube opent. Open dan de rectiole. Doe dit door het uiteinde 2 of 3 keer naar rechts te draaien. Zorg ervoor dat

u niet aan de rectiole trekt. Houd de rectiole rechtop en knijp er voorzichtig in tot er iets van de vloeistof uit komt. Houd hem daarna ingeknepen zodat er geen lucht terug instroomt.

3.



Steek het tuitje van de rectiole in het poepgaatje van uw kind. Zorg bij kinderen onder de 4 jaar dat het tuitje niet verder komt dan het eerste streepje. Dit geldt voor de gele rectiolen. Pas als de rectiole goed in het poepgaatje is ingebracht, knijpt u de tube met uw duim en wijsvinger in 1 keer leeg.

4.



Blijf knijpen als u de lege rectiole weer uit het poepgat terugtrekt! Door te blijven knijpen, voorkomt u dat de vloeistof weer 'teruggezogen' wordt in de rectiole. Druk daarna de billen voor 20 seconden tegen elkaar aan zodat de vloeistof er niet uitloopt.

5. Het is niet erg als er een klein beetje vloeistof in de tube achterblijft. U heeft dan toch genoeg gegeven.

6. Onthoud het tijdstip waarop u de rectiole heeft gegeven.

### Wat doet u als de diazepam niet werkt?

De diazepam in de rectiole wordt via het darmslijmvlies opgenomen in het bloed. Bijna altijd stopt de aanval na een paar minuten.

Bespreek met de arts wat u moet doen als de aanval niet zou stoppen ondanks de diazepam. U kunt het advies krijgen bijvoorbeeld om na een bepaalde tijd, nog een keer de rectiole te geven en/of een ambulance te bellen. Houdt u zich hierbij goed aan de gemaakte afspraken met uw arts.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Heeft uw kind een aanval gehad? Dan belt u uw behandelend arts. Is de aanval in de avond of nacht? Dan belt u de volgende ochtend. Als u direct hulp nodig heeft, belt u de huisarts of 112.

### Heeft u nog vragen?

Stel deze dan gerust aan uw arts. U kunt hiervoor bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.