

(her)aanmeldingsformulier

Antistollingsindicatie(s) met bijbehorende intensiteitsgroep aankruisen op achterzijde formulier!

Afwijkende intensiteit gewenst, namelijk INR: _____ - _____ Reden: _____

Behandelingsduur 3 maanden 6 maanden 1 jaar onbepaalde tijd

Mag de behandeling automatisch gestaakt worden? nee ja

Is huisbezoek medisch noodzakelijk? nee ja tot _____ reden _____

Reden opname: _____ Indicatie ongewijzigd gewijzigd

Voorgeschreven anticoagulans

acenocoumarol (1 mg)

fenprocoumon/Marcoumar (3 mg)

Datum														
INR														
Aantal tabl.														

Advies startdosering voor de eerste 3 dagen (voor nieuwe patiënten) respectievelijk:

Acenocoumarol 6 - 4 - 2 * aangepaste dosering 4 - 2 - 1

Fenprocoumon (Marcoumar) 4 - 2 - 1 * aangepaste dosering 3 - 1 - $\frac{1}{2}$

* Aangepaste dosering: ≥ 70 jaar, decompensatio cordis, zieke patiënt (koorts, infectie, braken, diarree), leverfunctiestoornis

(LMW)Heparine bij ontslag

nee ja, startdatum _____ naam _____ dosering _____

LMWH wordt gestaakt volgens protocol van de trombosedienst

Trombocytenaggregatieremmers nee ja, welke? _____ tot _____

Gebruikt patiënt overige medicatie? nee ja (medicatie lijst toevoegen)

Risico verhogende factoren

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> verhoogde bloedingsneiging | <input type="checkbox"/> diabetische retinopathie met bloedingen en/of neovascularisatie |
| <input type="checkbox"/> (recent) bloedende laesie in tractus digestivus | <input type="checkbox"/> nierinsufficiëntie |
| <input type="checkbox"/> recente intracerebrale bloeding | <input type="checkbox"/> maligniteit |
| <input type="checkbox"/> onvoldoende gereguleerde hypertensie | <input type="checkbox"/> malabsorptie syndroom |
| <input type="checkbox"/> wisselende mate van hartfalen (leverstuwning) | <input type="checkbox"/> leverinsufficiëntie <input type="checkbox"/> overige _____ |

Bijkomende ziekten _____

Verplicht

Naam arts (blokletters): _____ Handtekening: _____ Datum: _____

Specialisme: _____ Supervisor tijdens opname: _____

arts Jeroen Bosch Ziekenhuis Huisarts overige nl.: _____

Indicatie voor antistollingsbehandeling

Afhankelijk van de indicatie wordt de patiënt ingedeeld in één van de twee intensiteitsgroepen.

Intensiteitsgroep 1: therapeutische range 2.0 - 3.0

Intensiteitsgroep 2: therapeutische range 2.5 - 3.5

Indicaties	1	2	Overige (zeldzame) indicaties	Op aangeven behandelaar*
Atriumfibrilleren (AF)			<input type="checkbox"/> Overige (zeldzame) indicaties	Op aangeven behandelaar*
<input type="checkbox"/> AF+(cerebrale) embolie	1		<input type="checkbox"/> (Recidiverende) Tromboflebitis	Op aangeven behandelaar*
<input type="checkbox"/> AF+hartfalen	1		Namelijk:	
<input type="checkbox"/> AF+ reumatische mitralishartklepstenose	1			
<input type="checkbox"/> AF +recidief systemische embolie tijdens antistolling	1			
<input type="checkbox"/> AF + stent bij acuut coronair syndroom	1			
<input type="checkbox"/> AF + stent bij stabiel coronair lijden	1			
<input type="checkbox"/> AF + CHA2DS2VASc Score ≥ 1	1			
Biokleprothese en overige hartchirurgie			Perifeer arterieel vaatlijden in bijzondere gevallen	
<input type="checkbox"/> Biokleprothese + Risicofactor**	1		<input type="checkbox"/> Perifere arteriële embolie zonder AF	Op aangeven behandelaar*
<input type="checkbox"/> Biokleprothese in mitralispositie	1		<input type="checkbox"/> Veneuze bypass	1
<input type="checkbox"/> Mitralis hartklepreconstructie	1			
<input type="checkbox"/> Reumatische mitralishartklepstenose + voorgeschiedenis systemische embolie	1		Primaire Veneuze Trombo Embolie	
<input type="checkbox"/> Reumatische mitralishartklepstenose + breed linker atrium >55 cm	1		<input type="checkbox"/> Eerste DVT arm	1
			<input type="checkbox"/> Eerste DVT been/bekken	1
			<input type="checkbox"/> Eerste DVT overige locaties	1
			<input type="checkbox"/> Eerste longembolie	1
			Pulmonale hypertensie	
			<input type="checkbox"/> Pulmonale hypertensie	1
Cardiomyopathie (EF < 35%) in bijzondere gevallen			Recidief Veneuze Trombo Embolie	
<input type="checkbox"/> Cardiomyopathie + aneurysma cordis	1		<input type="checkbox"/> Recidief Longembolie en DVT bij adequate antistollingstherapie	2
<input type="checkbox"/> Cardiomyopathie + intra-cardiale trombus	2		<input type="checkbox"/> Recidief Longembolie en DVT zonder adequate antistollingstherapie	1
Cerebrale embolie bijzondere gevallen				
<input type="checkbox"/> Cryptogene cerebrale embolie tijdens acetylsalicylzuur of clopidogrel bij PFO, of aneurysma atriumseptum	1			
Kunstklep				
Type klep:				
<input type="checkbox"/> Mechanische aortahartkleprothese	1			
<input type="checkbox"/> Mechanische aortahartkleprothese + Risicofactor**	2			
<input type="checkbox"/> Mechanische hartkleprothese ongeacht positie + systemische embolie tijdens adequate antistolling	2			
<input type="checkbox"/> Mechanische hartkleprothese oude generatie ongeacht positie	2			
<input type="checkbox"/> Mechanische mitralis hartkleprothese	2			
<input type="checkbox"/> Mechanische tricuspidalis hartkleprothese	2			
<input type="checkbox"/> Mechanische pulmonalis hartkleprothese	2			
<input type="checkbox"/> Mechanische mitralis hartkleprothese + Risicofactor**	2			
<input type="checkbox"/> Mechanische tricuspidalis hartkleprothese + Risicofactor**	2			
<input type="checkbox"/> Mechanische pulmonalis hartkleprothese + Risicofactor**	2			
			* Gewenste intensiteit invullen op de eerste pagina bij "Afwijkende intensiteit"	
			** Risicofactor: vergroot atrium, of voorgeschiedenis systemische embolie of myocard infarct of lage ejectiefractie of atriumfibrilleren	