

Adrenaline auto-injector is houdbaar tot:

ADRENALINE AUTO-INJECTOR

Van: _____

Geboortedatum: _____

Allergisch voor: _____

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Polikliniek Kindergeneeskunde

Telefoonnummer: (073) 553 23 04

***Neem deze medicijnwijzer mee bij elk bezoek aan huisarts,
specialist of apotheek.***

Voor meer informatie over allergie en anafylactische reactie,
kijk dan op de onderstaande websites. Daar vindt u duidelijke
uitleg over het gebruik van de Adrenaline auto-injector.

www.epipen.nl / www.jext.nl / www.anafylaxie.com

Wat moet u doen bij een acute ernstige reactie

Ziet u één van de onderstaande reacties?

- zwelling tong en/of keel
- benauwdheid bij piepende ademhaling / heesheid
- bewustzijnsdaling
- braken (herhaaldelijk)
- diarree (herhaaldelijk)
- galbulten in combinatie met één van bovenstaande klachten

1) Spuit dan direct de adrenaline auto-injector:

.....

2) Bel direct 112: Vraag naar een ambulance en zeg dat het om een anafylactische reactie gaat.


Geef daarna:

- ☐ antihistaminicum:
- ☐ bij benauwdheid:


Bij reacties van alleen jeuk, roodheid en/of zwelling van de huid:
geef dan uw kind antihistaminicum:

Telefoonnummer ouders /verzorgers:


-
-



Pak de auto-injector in de hand waarmee u schrijft met de duim dicht bij de veiligheidsdop.



Verwijder de veiligheidsdop met de andere hand.



Zet de injectorpunt onder een rechte hoek (ongeveer 90°) tegen de buitenkant van de dij.



- Druk de injectorpunt stevig tegen de buitenkant van de dij tot u een 'klik' hoort.
- Houd de injector 3 seconden (tel langzaam tot 3) stevig op de plaats tegen de dij.
- Wanneer u de injector verwijdert zal de naald- beschermer zich automatisch over de naald sluiten.



- Wrijf 10 seconden over de injectieplaats.

Lees ook uw eigen bijsluiter!