

SUPPLEMENT INFORMATIEWIJZER ONCOLOGIE

ZORGTRAJECT BIJ TUMOR IN DE ENDELDARM

Bij een coloscopie is bij u een kwaadaardige tumor in de endeldarm ontdekt (endeldarmkanker, ook wel rectumcarcinoom genoemd). We begrijpen dat dit voor u een grote schok is. U gaat een onzekere periode tegemoet.

Om te bepalen welke behandeling we u het beste kunnen bieden, moeten we eerst weten of er wel of geen uitzaaiingen zijn. Daarom vragen we vervolgonderzoek aan. Hieronder leest u daar meer over.

Onderzoeken

De verpleegkundig specialist plant voor u de onderstaande onderzoeken in. Ook geeft ze u een schema mee waarop u ziet wanneer de onderzoeken plaatsvinden. De uitslag van de onderzoeken krijgt u van de MDL-arts.

Scan van de buik en de longen (CT thorax/abdomen)

Bij een CT thorax/abdomen onderzoek brengen we uw buikorganen en longen in beeld. In de folder CT-scan van de buik (foldercode RAD-083) leest u hoe u zich moet voorbereiden op dit onderzoek.

Scan van de endeldarm (MRI rectum)

Met een MRI-scan van het rectum (ofwel de endeldarm: het laatste deel van de dikke darm) kunnen we zien of de tumor door de darmwand is gegroeid. Ook is er te zien of er vergrote lymfeklieren zijn. In de folder MRI (foldercode RAD-027) leest u hoe u zich moet voorbereiden op dit onderzoek.

Behandeling

In een gezamenlijke bespreking (de oncologiebespreking) stellen artsen van verschillende specialismen gezamenlijk een behandelplan voor u op. De behandeling die u geboden krijgt, is afhankelijk van de uitslag van de onderzoeken.



Een behandeling kan als doel hebben u te genezen. Dit noemen we een curatieve behandeling. Als u niet meer beter kunt worden, is het doel van de behandeling uw klachten zoveel mogelijk te verlichten. Dit noemen we een palliatieve behandeling.

Genezende behandeling

De volgende behandelingen hebben als doel u te genezen:

1. Operatie.
2. Voorbehandeling die bestaat uit een korte bestraling (5 keer), gevolgd door een operatie. De operatie vindt een week na de laatste bestraling plaats.
3. Lange bestraling (25 keer) gecombineerd met chemotherapie tabletten. Na de laatste bestraling wordt er minimaal 10 weken gewacht voor er een operatie plaatsvindt.

Als er uitzaaiingen zijn die de chirurg kan opereren, gaan we uit van een genezende behandeling. Vaak wordt er dan voor de operatie chemotherapie gegeven.

Palliatieve behandeling

Wanneer u niet meer kunt genezen, is de behandeling erop gericht om de ziekte te remmen, klachten te verminderen en te zorgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Mogelijkheden daarvoor zijn:

- chemotherapie;
- afhankelijk van de klachten, kan er bestraling gegeven worden;
- eventueel kan er een stoma worden geplaatst.