

## Vleesbomen die klachten geven: behandel mogelijkheden

Heeft u vleesbomen waar u klachten van heeft? Deze consultkaart kan u en uw gynaecoloog helpen om uw mogelijkheden voor behandeling te bespreken

Behandel mogelijkheden ->	Embolisatie	Verwijdering via de vagina (hysteroscopie)	Verwijdering via de buik (kijkoperatie)	Baarmoeder weghalen (hysterectomie)
<b>Hoe werkt de behandeling?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- de radioloog brengt een slangetje in de bloedvaten via uw liezen</li> <li>- het gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer een uur</li> <li>- via het slangetje worden korreltjes in de bloedvaten gespoten die naar de vleesbomen gaan</li> <li>- deze korreltjes sluiten het bloedvat af, waardoor de vleesbomen kleiner worden en soms verdwijnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- met een kijkbuis wordt via de vagina in de baarmoeder gekeken</li> <li>- dit gebeurt meestal onder algehele anesthesie of ruggenprik en duurt ongeveer een half uur</li> <li>- de vleesbomen die uitsteken worden verwijderd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- met een snee in de buik of kijkoperatie worden de vleesbomen uit de baarmoeder verwijderd</li> <li>- dit gebeurt (altijd) onder algehele anesthesie en duurt ongeveer 1,5 tot 2,5 uur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- de gynaecoloog haalt de baarmoeder weg via de vagina, via een snee in de buik of met een kijkoperatie via de buik</li> <li>- eventueel kan de baarmoedermond blijven zitten</li> <li>- u krijgt algehele anesthesie en het duurt ongeveer 1 tot 2 uur</li> </ul>
<b>Blijft de baarmoeder zitten?</b>	Ja	Ja	Ja	Nee
<b>Wanneer is deze behandeling geschikt?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bijna alle vleesbomen zijn geschikt voor embolisatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vleesbomen tot 4 cm die uitsteken in de baarmoederholte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bijna alle vleesbomen kunnen verwijderd worden via de buik</li> <li>- vleesbomen tot maximaal 10 cm kunnen via een kijkoperatie verwijderd worden</li> <li>- bij meerdere, zeer grote of lastig gelegen vleesbomen is een buiksneede vaak nodig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elke baarmoeder met vleesbomen kan verwijderd worden</li> <li>- de keuze voor vaginale verwijdering via een buiksneede of via een kijkoperatie is afhankelijk van de grootte van de baarmoeder</li> </ul>
<b>Hoe goed helpt het tegen de klachten van de vleesbomen?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na 5 jaar heeft 75% van de vrouwen nog steeds voordeel van de behandeling</li> <li>- 25% laat binnen 5 jaar alsnog de baarmoeder verwijderen</li> <li>- kwaliteit van leven verbetert sterk, ongeveer hetzelfde als na het verwijderen van de baarmoeder</li> <li>- na 5 jaar zijn vrouwen even tevreden als na een verwijdering van de baarmoeder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- van vleesbomen die uitsteken in de baarmoederholte weten we dat die hevige menstruatie veroorzaken</li> <li>- Als het lukt om deze vleesbomen helemaal te verwijderen, is bij de meeste vrouwen de hevige menstruatie voorbij</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- als het lukt om alle vleesbomen te verwijderen verbeteren meestal de menstruatieklachten. Zeker vleesbomen die tegen de baarmoederholte aanliggen</li> <li>- drukkklachten verbeteren omdat de vleesbomen helemaal worden verwijderd</li> <li>- vaak verbeteren de pijnklachten, maar dit is niet helemaal zeker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- u wordt niet meer ongesteld na de operatie</li> <li>- meestal zijn de drukkklachten verdwenen omdat de vleesbomen verwijderd zijn</li> <li>- veel vrouwen ervaren verbetering van de pijnklachten. Het is niet zeker of deze helemaal overgaan</li> <li>- de kwaliteit van het leven verbetert sterk</li> <li>- vrouwen zijn erg tevreden</li> </ul>
<b>Wat zijn de mogelijke risico's?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ernstige complicatie komen bij ongeveer 3 van de 100 vrouwen voor, zoals trombose, een ernstige infectie, etcetera</li> <li>- vrouwen boven de 45 jaar komen soms na de behandeling in de overgang (4%)</li> <li>- soms kunt u stukjes van de vleesboom verliezen via de vagina</li> <li>- sommige vrouwen hebben last van afscheiding die enkele weken kan duren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- er kan een perforatie optreden; dit betekent dat de kijkbuis per ongeluk door de wand van de baarmoeder gaat. De behandeling kunnen we dan meestal niet afmaken</li> <li>- soms lukt het niet om de vleesboom in 1 keer weg te halen. Sommige vrouwen moeten dan nog een keer de behandeling krijgen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- er kan veel bloedverlies optreden, waardoor een bloedtransfusie nodig is</li> <li>- als de operatie via een kijkbuis gebeurt, bestaat er een kans van 2-5% dat er toch nog een buiksneede moet worden gemaakt</li> <li>- als u in de toekomst zwanger wordt, is er in veel gevallen een keizersneede nodig</li> <li>- als de baarmoeder geopend wordt, kunnen er verklevingen in de holte ontstaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 van de 100 vrouwen (5%) krijgt een complicatie, zoals trombose, een infectie, schade aan een orgaan of een nabloeding.</li> <li>- hierdoor kunt u tijdelijk meer bloed verliezen, koorts of pijn hebben. Soms moet u aanvullende medicijnen slikken en het herstel kan langzamer gaan</li> </ul>
<b>Hoe lang blijf ik in het ziekenhuis?</b>	2 - 3 dagen	Dagbehandeling	1 - 2 dagen (kijkoperatie) 2 - 3 dagen (buiksneede)	1 - 2 dagen (kijkoperatie) 2 - 3 dagen (buiksneede)
<b>Hoe lang duurt het voordat ik geen klachten meer heb van de behandeling?</b>	2 - 3 weken	Enkele dagen	2 - 4 weken (kijkoperatie) 6 weken (buiksneede)	2 - 4 weken (kijkoperatie) 6 weken (buiksneede)
<b>Kan ik na de behandeling nog zwanger worden?</b>	U kunt na de embolisatie niet meer zwanger worden	U kunt na deze behandeling zwanger worden	U kunt na deze behandeling zwanger worden	U kunt niet meer zwanger worden

Bronvermelding: Amsterdam UMC