



KINDERGENEESKUNDE

## Diazepam bij een koortsstuijp of een epileptische aanval bij kinderen

*Het medicijn diazepam (stesolid®) schrijven we voor bij kinderen die één of meer koortsstuijpen of epileptische aanvallen hebben gehad. Dit medicijn kan een nieuwe aanval stoppen.*

### Hoe stopt u een epileptische aanval of koortsstuijp?

Een aanval gaat meestal vanzelf over. Het verstijven of schokken stopt dan helemaal en uw kind kan weer rustig ademen. Toch is het soms nodig om een medicijn te geven om de aanval te stoppen. Dit medicijn kunt u zelf geven aan uw kind, in de vorm van een rectiole (ook wel klysma genoemd). Een rectiole is een tubetje met een vloeibaar medicijn, diazepam. U brengt de rectiole in het poepgatje van uw kind en knijpt dan het tubetje leeg.

### Afspraken met de arts

De arts spreekt met u af wanneer u de rectiole mag geven. Het gaat vooral over hoeveel minuten na het begin van de aanval u de rectiole mag geven. De arts schrijft voor hoeveel u kind nodig heeft.

.....

.....

.....

.....

.....

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© Jeroen Bosch Ziekenhuis

### Hoe geeft u de rectiole?



Pak de rectiole en leg daarna uw kind op de zij. Is uw kind nog klein? Dan kunt u het beste uw kind op de buik over uw knie leggen. Houd de ademweg vrij en zorg dat speeksel uit de mond kan weglopen. Ontbloot de billen. Bij grotere kinderen is het prettig als u de privacy van uw kind beschermt door ervoor te zorgen dat omstanders de ontblote billen niet zien.



Haal de rectiole uit de verpakking. Houd deze met de punt omhoog, zodat de vloeistof er niet uitloopt als u de tube opent. Open dan de rectiole. Doe dit door het uiteinde 2 of 3 keer naar rechts te draaien. Zorg ervoor dat

