

Patiënteninformatie longziekten:
Pemetrexed (Alimta) - Carboplatine + radiotherapie

Verloop chemokuur

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdende middelen). Deze middelen zijn Pemetrexed (Alimta) en Carboplatine. Daarnaast start u zo spoedig mogelijk met radiotherapie. Dit wordt ook wel bestraling genoemd. Dit kan zijn vanaf de 1^e dag van de behandeling of soms een paar dagen later, gedurende 5 dagen per week, ongeveer 6 weken lang (vaak 30 dagen). De bestralingsarts zal dit met u bespreken.

U krijgt beide middelen 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Uw arts zal bespreken hoeveel van deze kuren u krijgt. Deze chemokuur vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 1,5 uur.

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Zie medicatieoverzicht op de achterzijde van deze informatie.

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie vinden er extra controles plaats.

Contact opnemen

In de informatiewijzer oncologie en via www.ibz.nl kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Op de achterzijde van dit formulier vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen.

Bijwerkingen en aandachtspunten

De chemotherapie en bijbehorende medicatie die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen.

De algemene bijwerkingen staan beschreven in de informatiewijzer oncologie. De specifieke bijwerkingen voor uw chemotherapie zijn:

- Toename traanafscheiding (1-10%);
- Huiduitslag/jeuk (meer dan 10%);
- Tuitende oren/gehoorverlies (1-10%);
- Duizeligheid (1-10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten (1-10%);
- Ademhalingsproblemen (1-10%);
- Slapeloosheid/opgewondenheid;
- Verhoogde glucosespiegel.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met chemotherapie. Meldt het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheker.

Vervolg patiënten informatie longziekten: Pemetrexed (Alimta®)/Carboplatin + radiotherapie

	Dag voor kuur	Dag van de kuur	1 ^e dag na de kuur	2 ^e dag na de kuur	3 ^e dag na de kuur
Dexamethason 4 mg tablet	's ochtends 2 tabletten innemen	X	's ochtends 2 tabletten innemen	's ochtends 2 tabletten innemen	X
Metoclopramide 10 mg tablet	X	Zo nodig bij misselijkheid maximaal 3 per dag	Zo nodig bij misselijkheid maximaal 3 per dag	Zo nodig bij misselijkheid maximaal 3 per dag	Zo nodig bij misselijkheid maximaal 3 per dag
Foliumzuur 0,5 mg tablet	Dagelijks 1 tablet; starten 1 op dag 1 van de 1e chemokuur, stop 3 weken na de laatste Alimta®/Carboplatin chemokuur				
Vitamine B12 injectie	Één keer per 9 weken een injectie; starten op dag 1 van de 1e chemokuur, stop 3 weken na laatste Alimta®/Carboplatin chemokuur				

Medicatieoverzicht voorkomen bijwerkingen Pemetrexed (Alimta®)/Carboplatine chemokuur

Uw behandelend arts schrijft deze medicatie voor, de injectie vitamine B12 kunt u door de huisarts laten toedienen.