

Patiënteninformatie longziekten:
Alimta® (=Pemetrexed)/Carboplatin

Verloop chemokuur

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met twee soorten cytostatica (kankerbestrijdend middel). Deze middelen zijn Alimta® (dit is hetzelfde als Pemetrexed) en Carboplatin.

U krijgt beide middelen 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Uw arts zal bespreken hoeveel van deze kuren u krijgt. Deze chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden. De behandeling duurt ongeveer 1 ½ uur.

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Zie medicatieoverzicht op de achterzijde van deze informatie.

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie vinden er extra controles plaats.

Bijwerkingen en aandachtspunten

De chemotherapie en bijbehorende medicatie die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen.

De algemene bijwerkingen staan beschreven in de informatiewijzer oncologie. De specifieke bijwerkingen voor uw chemotherapie zijn:

- Oogklachten zoals droge ogen, toename traanafscheiding, oogontsteking (1-10%);
- Huiduitslag/jeuk (meer dan 10%);
- Vocht in de benen (1-10%);
- Tuitende oren/gehoorverlies (> 10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten(1-10%);
- Slapeloosheid/opgewondenheid;
- Verhoogde glucosespiegel.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met chemotherapie. Meldt het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheker.

Contact opnemen

In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Op de achterzijde van dit formulier vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus toegediend. Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt mee te brengen naar het ziekenhuis.

Vervolg patiënteninformatie longziekten: Alimta®/Carboplatin

	Dag voor de kuur	Dag van de kuur	1 ^e dag na de kuur	2 ^e dag na de kuur	3 ^e dag na de kuur
Dexamethason 4 mg	's ochtends 2 tabletten innemen	x	's ochtends 2 tabletten innemen	's ochtends 2 tabletten innemen	x
Metoclopramide 10 mg	x	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag
Foliumzuur 0,5 mg	Dagelijks 1 tablet; starten 1 op dag 1 van de 1e chemokuur, stop 3 weken na de laatste Alimta®/Carboplatin chemokuur				
Vitamine B12 injectie	Één keer per 9 weken een injectie; starten op dag 1 van de 1e chemokuur, stop 3 weken na laatste Alimta®/Carboplatin chemokuur				

Medicatieoverzicht voorkomen bijwerkingen Alimta®/Carboplatin chemokuur

Uw behandelend arts schrijft deze medicatie voor, de injectie vitamine B12 kunt u door de huisarts laten toedienen.

De risicoperiode

De medicijnen die u krijgt toegediend, zitten nog een aantal dagen na de toediening in uw lichaam. In uitscheidingsproducten, zoals urine, ontlasting en braaksel, zitten dan nog resten van het medicijn. Voor de medicijnen die u krijgt geldt dat deze 4 dagen in de uitscheidingsproducten aanwezig blijven. Dit noemen we de risicoperiode.