

Patiënteninformatie longziekten: Taxol®/Carboplatin

Verloop chemokuur

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdend middel). Deze middelen zijn Taxol® (dit is hetzelfde als Paclitaxel) en Carboplatin.

U krijgt deze middelen 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Uw arts zal bespreken hoeveel van deze kuren u krijgt. Deze chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden. De behandeling duurt ongeveer 4,5 uur.

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Zie medicatieoverzicht op de achterzijde van deze informatie.

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie vinden er extra controles plaats.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines gaan niet samen met chemotherapie. Meldt het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar. Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheker.

Contact opnemen

In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Op de achterzijde van dit formulier vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus toegediend. Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt mee te brengen naar het ziekenhuis.

Bijwerkingen en aandachtspunten

De chemotherapie en bijbehorende medicatie die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen staan beschreven in de informatiewijzer oncologie. De specifieke bijwerkingen voor uw chemotherapie zijn:

- Overgevoeligheidsreacties, zich uitend in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van de huid, bloeddrukdaling of stijging (>10%);
- Haarausval(>10%);
- Spierpijn/Gewrichtspijn(>10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten(>10%);
- Gehoorverlies m.n. van de hoge tonen(>10%);
- Oorsuizen(1-10%);
- Nagelafwijkingen(1-10%);
- Slapeloosheid/opgewondenheid;
- Verhoogde glucosespiegel.

**Vervolg patiënteninformatie longziekten:
Taxol®/Carboplatin**

	Dag van de kuur	1 ^e dag na de kuur	2 ^e dag na de kuur	3 ^e dag na de kuur
Dexamethason 8 mg		's ochtends 2 tabletten á 4 mg innemen	's ochtends 2 tabletten á 4 mg innemen	
Metoclopramide 10 mg	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag
Paracetamol 500 mg	Bij spierpijn paracetamol 500–1000 mg per keer, zo nodig elk 6 uur			

Medicatieoverzicht voorkomen bijwerkingen Taxol®/Carboplatin chemokuur