

Patiënteninformatie longziekten: Cyclofosfamide Doxorubicine Etoposide (CDE-kuren)

Verloop chemokuur

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met 3 soorten cytostatica (kankerbestrijdend middel). Deze middelen zijn Cyclofosfamide (dit is hetzelfde als Endoxan®), Doxorubicine en Etoposide (dit is hetzelfde als Vepesid®).

U krijgt deze middelen 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Uw arts zal met u bespreken hoeveel kuren u gaat krijgen. De behandeling duurt op de eerste dag ongeveer: 3 uur en op de tweede en derde dag: 1,5 uur.

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie innemen. Zie medicatieoverzicht op de achterzijde van deze bladzijde.

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie vinden er extra controles plaats.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines gaan niet samen met chemotherapie. Meldt het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheker.

Contact opnemen

In de informatiewijzer oncologie kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

Bijwerkingen en aandachtspunten

De chemotherapie die u krijgt geeft mogelijk bijwerkingen.

De meest voorkomende zijn:

- Vermoeidheid/zwakte (>10%);
- Misselijkheid/braken/buikpijn/maagklachten (>10%);
- Verminderde eetlust/smaakverandering (>10%);
- Diarree/obstipatie (moeizame ontlasting) (>10%);
- Haaruitval (>10%);
- Blaasontsteking (>10%);
- Verandering van de bloedwaarden (>10%);
- Irritatie of ontsteking van de mond/keel (1-10%);
- Overgevoelighedsreacties, zich uitend in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van de huid, bloeddrukdaling of stijging (1-10%);
- Huiduitslag/jeuk (1-10%);
- Duizeligheid (1-10%);
- Benauwdheidsklachten (1-10%);
- Hartproblemen zoals een veranderd hartritme (1-10%);
- Gewrichtspijnen (1-10%);
- Hogere of lagere bloeddruk (1-10%),

Bij deze behandeling zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

- Op de eerste dag van de kuur kan de urine rood gekleurd zijn van de medicijnen en in uitzonderlijke gevallen ook het traanvocht.
- Als u contactlenzen draagt raden we u aan deze de eerste 3 dagen van de kuur niet te dragen.
- Indien u bekend bent bij de trombose-dienst, meldt dan daar het starten en/of stoppen van deze behandeling. Etoposide wat onderdeel is van deze behandeling kan invloed hebben op de werking van de medicijnen waarvoor u bij de trombose-dienst bent.

In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl vindt u meer algemene informatie over onder andere chemotherapie, bijwerkingen en adviezen.

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Hieronder vindt u een medicatieoverzicht met de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemotherapiekuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus toegediend.

	Dag 1 van de kuur	Dag 2 van de kuur	Dag 3 van de kuur	Dag 4 van de kuur	Dag 5 en 6 van de kuur
Dexamethason 4 mg	X	's Ochtends 2 tabletten tegelijk innemen	's ochtends 2 tabletten tegelijk innemen	's ochtends 2 tabletten tegelijk innemen	x
Metoclopramide 10 mg bij klachten van misselijkheid innemen (niet standaard)	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag

[Medicatieoverzicht voorkomen bijwerkingen Cyclofosfamide, Doxorubicine Etoposide chemokuur](#)