

Patiënteninformatie longziekten:
Docetaxel (Taxotere®)/Carboplatine chemotherapie

Verloop chemokuur

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met twee soorten cytostatica (kankerbestrijdend middel). Deze middelen zijn Docetaxel (dit is hetzelfde als Taxotere®) en Carboplatine.

U krijgt deze middelen 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Uw arts zal bespreken hoeveel van deze kuren u krijgt. De behandeling duurt ongeveer 2½ uur. Deze chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden.

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Zie medicatieoverzicht op de achterzijde van deze informatie.

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie vinden er extra controles plaats.

Bijwerkingen en aandachtspunten

De chemotherapie en bijbehorende medicatie die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Vermoeidheid/zwakte (> 10%);
- Spierpijn & griepachtige klachten (> 10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten (> 10%);
- Misselijkheid/braken/maagklachten (> 10%);
- Verminderde eetlust/smaakverandering(> 10%);
- Diarree/obstipatie (moeizame ontlasting) (> 10%);
- Haaruitval (> 10%);
- Overgevoeligheidsreacties, zich uitend in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van de huid, bloeddrukdaling (> 10%);
- Benauwdheid (> 10%);
- Irritatie of ontsteking van de mond/keel (> 10%);
- Verandering van de bloedwaarden (> 10%);
- Huiduitslag/jeuk (> 10%);
- Vocht vasthouden (> 10%);
- Nagelaandoeningen (> 10%);
- Tuitende oren/gehoorverlies (> 10%);
- Slapeloosheid/opgewondenheid.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met chemotherapie. Meldt het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheker.

In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl vindt u meer algemene informatie over onder andere chemotherapie, bijwerkingen en adviezen.

Contact opnemen

In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Hieronder vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus toegediend. Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt mee te brengen naar het ziekenhuis.

	Dag voor kuur	Dag van de kuur	1 ^e dag na de kuur	2 ^e dag na de kuur	3 ^e dag na de kuur
Dexamethason 4 mg	's ochtends en 's avonds 2 tabletten innemen	Geen tabletten innemen	's ochtends en 's avonds 2 tabletten innemen	's ochtends 2 tabletten innemen	x
Metoclopramide 10 mg	x	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag
Paracetamol 500 mg			Bij spierpijn maximaal 8 per dag		

Medicatieoverzicht voorkomen bijwerkingen Docetaxel (Taxotere®)/Carboplatine chemokuur