

Patiënteninformatie longziekten: Etoposide (Vepesid)

Verloop chemokuur

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdend middel). Dit middel is Etoposide (dit is hetzelfde als Vepesid®).

Deze chemotherapie kan zowel via een infuus of via capsules worden toegediend. Uw arts heeft besloten u capsules voor te schrijven. U neemt deze gedurende vijf achtereenvolgende dagen in tijdens een periode van 3 of 4 weken, de arts zal dit met u bespreken. De periode van 3 of 4 weken wordt een kuur genoemd.

Ter voorkoming van bijwerkingen kunt u medicatie innemen. Zie medicatieoverzicht op de achterzijde van deze bladzijde.

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie vinden er extra controles plaats.

U kunt deze chemokuur alleen ophalen bij de Jeroen Bosch Apotheek. Deze apotheek bevindt zich in het ziekenhuis op de begane grond, naast de ingang.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines gaan niet samen met chemotherapie. Meldt het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar. Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheker.

Contact opnemen

In de informatiewijzer oncologie kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

Bijwerkingen en aandachtspunten

De chemotherapie die u krijgt geeft mogelijk bijwerkingen.

De meest voorkomende zijn:

- Vermoeidheid/zwakte/slaperigheid;
- Misselijkheid/braken/maagklachten;
- Verminderde eetlust/smaakverandering;
- Diarree/obstipatie (moeizame ontlasting);
- Oogontsteking;
- Haaruitval;
- Irritatie of ontsteking van de mond/keel;
- Verandering van de bloedwaarden;
- Huiduitslag/jeuk;
- Gewrichtspijn;
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten;
- Veranderde menstruatie/vruchtbaarheid en seksualiteit.

Bij het gebruik van Etoposide zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

- Etoposide kan de werkingen van middelen die de bloedstolling tegengaan versterken. Meldt het starten en/of stoppen van Etoposide bij uw trombosedienst;
- Bewaar de capsules Etoposide beneden 25°C;
- Was na inname direct uw handen;
- Neem de capsules heel in met een half glas water (niet bijten, breken of open maken);
- Het aantal capsules wat moet worden ingenomen is per patiënt anders;
- Neem de capsules direct achter elkaar in op een lege maag;
- De lege doordrukstrips in dubbele stevige afvalzakken doen en afvoeren met het normale huisvuil.

In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl vindt u meer algemene informatie over onder andere chemotherapie, bijwerkingen en adviezen.

	Dag 1 van de kuur	Dag 2 van de kuur	Dag 3 van de kuur	Dag 4 van de kuur	Dag 5 van de kuur
Etoposide Capsules	's ochtends op lege maag innemen	's ochtends op lege maag innemen	's ochtends op lege maag innemen	's ochtends op lege maag innemen	's ochtends op lege maag innemen
Metoclopramide 10 mg bij misselijkheid	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaa l 3 per dag

[Medicatieoverzicht Etoposide.](#)