

Patiënteninformatie longziekten:

Cisplatine en Etoposide + radiotherapie bij het niet kleincellig longcarcinoom

Verloop chemokuur

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdend middelen). Deze middelen zijn Cisplatine en Etoposide. Daarnaast start u zo spoedig mogelijk met radiotherapie. Dit wordt ook wel bestraling genoemd. Dit kan zijn vanaf de 1^e dag van de behandeling of soms een paar dagen later. De radiotherapie wordt 1 keer per dag gedurende 5 dagen per week, ongeveer 6 weken lang (vaak 30 dagen), toegediend. Het bestralingsinstituut zal dit met u bespreken.

U krijgt op de 1^e dag beide middelen via een infuus toegediend. U verblijft hiervoor ongeveer 7 uur in het ziekenhuis. Op dag 2 en 3 krijgt u alleen Etoposide via het infuus. De behandeling met Etoposide zal ongeveer 1,5 uur duren. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. In principe krijgt u 3 kuren chemotherapie. Mocht dit anders zijn dan bespreekt de arts dit met u.

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Zie medicatieoverzicht op de achterzijde van deze informatie.

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie vinden er extra controles plaats.

Bijwerkingen en aandachtspunten

De chemotherapie en bijbehorende medicatie die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen staan beschreven in de informatiewijzer oncologie.

De specifieke bijwerkingen voor uw chemotherapie zijn:

- Overgevoelighedsreacties, zich uitend in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van de huid, bloeddrukdaling of stijging; (1-10%)
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten; (1-10%)
- Haaruitval; (meer dan 10%)
- Tuitende oren/gehoorverlies; (meer dan 10%)
- Opgewondenheid;
- Indien u bekend bent bij de trombose dienst, meldt dan daar het starten en/of stoppen van Etoposide. Etoposide kan de werkingen van middelen, die de bloedstolling tegengaan versterken.

Radiotherapie kan pijn en slikklachten geven in keel en slokdarm. Dit kan het eten en drinken bemoeilijken. Neem bij deze klachten tijdig contact op met de verpleegkundig specialist van het JBZ.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met chemotherapie. Meldt het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar. Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheker.

Contact opnemen

In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Hieronder vindt u een overzicht van de medicatie ter voorkoming van bijwerkingen en de tijdstippen van inname. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus toegediend. Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt mee te brengen naar het ziekenhuis.

	Dag van de kuur	1 ^e dag na de kuur	2 ^e dag na de kuur	3 ^e dag na de kuur	4 ^e + 5 ^e + 6 ^e dan na de kuur
Dexamethason 4mg	Via infuus op afdeling	's ochtends 2 tabletten innemen (8mg)	's ochtends 2 tabletten innemen (8mg)	s ochtends 2 tabletten innemen (8mg)	x
Metoclopramide 10 mg*	x	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag

Medicatieoverzicht voorkomen bijwerkingen Cisplatine/Etoposide chemokuur dag 1 t/m 6

*conform voorschrift behandelaar