

Patiënteninformatie longziekten: Pembrolizumab /Paclitaxel/Carboplatin

Verloop behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met immunotherapie (Pembrolizumab) en chemotherapie (Paclitaxel en Carboplatin).

U krijgt deze middelen 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Deze behandeling kan poliklinisch gegeven worden. De behandeling duurt ongeveer 6 uur. In principe krijgt u 4 van deze kuren. Na deze kuren wordt mogelijk doorgedaan met een onderhoudsbehandeling. Een onderhoudsbehandeling betekent dat u gedurende maximaal ongeveer 2 jaar iedere 3 weken een behandeling met immunotherapie (Pembrolizumab) krijgt.

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Zie medicatieoverzicht op de achterzijde van deze informatie.

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie vinden er extra controles

Bijwerkingen en aandachtspunten

De behandeling en bijbehorende medicatie die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen (chemo- en immunotherapie) staan beschreven in medimapp op mijnJBZ.nl. De specifieke bijwerkingen voor uw behandeling zijn:

- Overgevoeligheidsreacties, zich uitend in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van de huid, bloeddrukdaling of stijging ($> 34\%$);
- Benauwdheidsklachten, hoesten 1–10%;
- Huiduitslag $> 10\%$;
- Griepachtige verschijnselen 1–10%;
- Verminderde eetlust 1–10%;
- Diarree/buikpijn $> 10\%$
- Spierpijn/Gewrichtspijn ($> 10\%$);
- Haaruitval ($> 10\%$);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten ($> 10\%$);
- Gehoorverlies m.n. van de hoge tonen, oorsuizen ($> 10\%$);
- Nagelafwijkingen ($> 1-10\%$);

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines gaan niet samen met chemotherapie. Meldt het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar. Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee te brengen. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheker.

Contact opnemen

In de informatiewijzer oncologie en via www.jbz.nl kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

**Vervolg patiënteninformatie longziekten:
Pembrolizumab /Paclitaxel/Carboplatin/**

	Dag van de kuur	1 ^e dag na de kuur	2 ^e dag na de kuur	3 ^e dag na de kuur
Dexamethason 8 mg	Via infuus	's ochtends 2 tabletten innemen	's ochtends 2 tabletten innemen	
Metoclopramide 10 mg	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag
Paracetamol 500 mg	Bij spierpijn maximaal 8 per dag			

[Medicatieoverzicht voorkomen bijwerkingen Pembrolizumab/paclitaxel/Carboplatin chemokuur](#)

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Hierboven vindt u het medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus toegediend. Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt mee te brengen naar het ziekenhuis.

De medicatie waarbij het begrip 'zo nodig' staat adviseren wij om in te nemen als u klachten heeft van misselijkheid. Mocht u geen klachten hebben dan raden wij u aan deze medicatie ook niet te nemen.