

Behandelschema Pazopanib (Votrient®) kuur (oraal) bij gevorderd en/of uitgezaaid niercelcarcinoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Pazopanib. Dit behoort tot de middelen die een specifiek enzym (Tyrosine kinase) remmen en daarmee de groei van de tumor remmen. Pazopanib is geen chemotherapie, maar valt onder de groep 'doelgerichte middelen' oftewel 'targeted therapie'. De totale duur dat u dit gaat gebruiken, wordt in overleg met u bepaald.

Het verloop van de kuur

- Medicatie die u in tabletvorm krijgt:
Pazopanib 200 óf 400 mg: eenmaal daags ... tabletten (continue).
Metoclopramide 10 mg: maximaal 3 maal daags 1 tablet indien nodig bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met de arts of verpleegkundig specialist.

U kunt de Pazopanib uitsluitend verkrijgen bij de Jeroen Bosch Apotheek.

Gebruiksaanwijzing

- neem de tabletten dagelijks op hetzelfde tijdstip in met water
- tabletten mogen niet gebroken of vermalen worden
- neem de tabletten ten minste 1 uur vóór of 2 uur na het eten in
- U mag géén grapefruitsap in combinatie met Pazopanib gebruiken. Dit kan namelijk de concentratie van Pazopanib verhogen.
- U mag géén sint- Janskruid in combinatie met Pazopanib gebruiken. Dit kan namelijk de concentratie van Pazopanib verlagen.
- het gebruik van maagzuurremmers altijd overleggen met de arts of verpleegkundig specialist.

Als u een dosis bent vergeten of hebt uitgebraakt

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
- indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet opnieuw de tabletten in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Controles

Een keer per 4 weken vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist plaats. Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen zal de dosis pazopanib aangepast worden.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, maagklachten, misselijkheid en braken. Dit komt met name tijdens de beginfase van de behandeling voor.

- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- diarree en/of verandering van het ontlastingspatroon
- veranderingen van de huid
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- invloed op de werking van het beenmerg

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- tijdens het gebruik van Pazopanib kunt u mogelijk last krijgen van zwelling rond de ogen of oogleden
- tijdens het gebruik van Pazopanib kan er een tijdelijke verkleuring/verandering van de huid optreden. Soms kan een milde vorm van huiduitslag (= rash) ontstaan. Na het stoppen met Pazopanib komt de oorspronkelijke kleur/structuur van de huid weer terug.
- tijdens het gebruik van Pazopanib kan er een ontkleuring van het haar optreden. Verder kan het haar dunner worden
- hoofdpijn, duizeligheid en hoge bloeddruk kunnen voorkomen tijdens het gebruik van Pazopanib
- er kan heesheid optreden tijdens het gebruik van Pazopanib
- een **hand-voet-huidreactie** is een voorkomende klacht bij deze behandeling. Dit syndroom uit zich door het tintelen, gevoelloos, pijnlijk, gezwollen of rood worden van de handpalmen en/of voetzolen. Mocht u hier last van krijgen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.
- als u geopereerd moet worden of een ingreep moet laten doen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.

Adviezen om het hand-voet-huidreactie te voorkomen en/of te beperken

- vermijd hete lange douches; neem korte lauwe douches
- vermijd direct zonlicht; verblijf zoveel mogelijk in de schaduw
- vermijd nauw zittend schoeisel of schoenen met hoge hakken
- vermijd het dragen van knellende kleding (handschoenen en sokken)
- vermijd het dragen van knellende ringen, armbanden, horloges etc.
- vermijd intensieve inspanningen die een wondje/letsel aan de handen of voeten kunnen veroorzaken (tuinieren, joggen)
- vermijd blootstelling van de huid aan zeer heet water (bijv. de afwas)
- smeer handen en voeten regelmatig in met vaseline of uierzalf, om uitdrogen te voorkomen.
- koel- of ijskompresen kunnen verlichting geven bij pijn. (Vermijd direct contact met de huid)
- verwijder eeltvorming op de handen en voeten vooraf aan de behandeling

Adviezen om 'rash'(uitslag in het gezicht en op het lichaam) te voorkomen en/of te beperken

- gebruik een vochtinbrengende crème op de huid
- gebruik antiroosshampoo om klachten van de hoofdhuid te verlichten

- gebruik antiroosshampoo om het lichaam te wassen ter verlichting van de jeuk
- draag loszittende kleding
- vermijd te warme douches
- vermijd directe blootstelling aan zonlicht
- gebruik geen zeep, maar bad- of doucheolie