

Behandelschema Temsirolimus kuur bij gevorderd niercelcarcinoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Temsirolimus. Dit middel behoort tot de groep angiogeneseremmers. Deze remmen bloedvatvorming door remming van specifieke eiwitten die zorgen voor groei van de tumor. Temsirolimus remt het eiwit mTOR. Temsirolimus is geen chemotherapie. Temsirolimus is 'doelgerichte therapie'. Deze kuur wordt éénmaal in de week gegeven. Het aantal kuren wordt in overleg met u bepaald.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:
Temsirolimus: dag 1
Vóór de toediening van Temsirolimus, krijgt u medicijnen toegediend om een allergische reactie zoveel mogelijk te voorkomen.
2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:
Metoclopramide 10 mg dag 1, zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid

De behandeling duurt in totaal ± 2 uur.

Controles

Controle arts: vóór start nieuwe kuur en de eerste drie keer nadien à 3 weken afwisselend bij arts en VSO.

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur de eerste drie weken; daarna 3-wekelijks en indien nodig.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- diarree
- invloed op de werking van het beenmerg
- veranderingen van de huid

NB: Bijwerkingen zijn sterk uiteenlopend en verschillen sterk per persoon.

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- er kan een allergische overgevoelighedsreactie optreden (verschijnselen: zwelling van het gezicht, de tong en de keelholte, moeite met ademen)
- uw bloedstolling kan verhoogd worden (waaronder trombose in de aderen, longembolie)
- er kunnen problemen met wondgenezing optreden
- U kunt last krijgen van vocht vasthouden (oedeem) Vaak uit zich dit in een zwelling rond de ogen, aan de enkels, benen of andere delen van het lichaam, of aan gewichtstoename in het algemeen.
- er kan acne en/of ernstige afschilfering van de huid optreden
- In zeldzame gevallen kan de bloedsuikerspiegel verhoogd worden, de werking van de nieren kan verminderen, en er is een zeer klein risico op hersenbloeding en longproblemen optreden

