

## Behandelschema Docetaxel/Prednison kuren bij prostaatkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet Docetaxel/Prednison kuur. De kuur wordt eenmaal per drie weken gegeven. In principe krijgt u 6 kuren. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie kan poliklinisch worden gegeven.

### Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:  
Docetaxel: dag 1  
Daarnaast krijgt u vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus toegediend om misselijkheid en braken te voorkomen.
2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:  
Prednisolon 5 mg dag 1 t/m 21, 2x daags  
Dexamethason 8 mg dag 0, 2x daags (niet op lege maag innemen)  
Metoclopramide 10 mg dag 1 t/m 4, zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid

De behandeling duurt ± 1,5 uur. Indien u kiest voor hoofdhuidkoeling duurt de behandeling ± 2 uur.

### Controles

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur  
Controle arts/verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur  
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de mogelijkheid dat de kuur een week wordt uitgesteld.  
Bij uitstel dient u wel door te gaan met prednison 2 x daags 5mg.

### Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- invloed op de werking van het beenmerg
- vermoeidheid
- haaruitval
- invloed op vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid en nagels

### Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens toediening Docetaxel. U begint één dag vóór de toediening van Docetaxel met het innemen van medicijnen om dit te voorkomen. Reacties kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst, koorts.
- spierpijn/gewrichtspijn: dit kan optreden 2-3 dagen na de infusie en verdwijnt weer na 3-4 dagen. De pijn kan met Paracetamol 500 mg bestreden worden.
- neuropathie, dit is een stoornis aan de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of “doofheid” van handen en/of voeten. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u hier last van heeft, bespreek het dan tijdens uw eerstvolgende polibezoek.
- nagelafwijkingen kunnen voorkomen; de groei kan vertraagd worden, de nagels kunnen ook brozer worden waardoor ze eerder splijten, breken of loslaten. Daarnaast kunnen witte lijnen voorkomen. De veranderingen verdwijnen meestal langzaam na beëindiging van de behandeling.
- Prednison kan de eetlust verhogen, soms wat vocht in het lichaam vasthouden. Soms hebben mensen ten gevolge van deze medicijnen wat moeite met inslapen

- bij deze behandeling begint uw haar  $\pm$  3 weken na de eerste kuur uit te vallen
- bij deze behandeling is het mogelijk om hoofdhuidkoeling toe te passen om haaruitval te voorkomen/beperken. Uw verpleegkundige zal u hier meer informatie over geven.
- Docetaxel blijft 4 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.