

Behandelschema: PARP-remmer niraparib

Uw arts heeft u voorgesteld te starten met de aanvullende therapie (ook wel doelgerichte therapie) niraparib. Niraparib remt de werking van het eiwit PARP, dat normaal zorgt voor herstel van de kankercel. Niraparib blokkeert de werking van het PARP-eiwit, waardoor de kankercel minder goed schade kan herstellen en stoppen met groeien.

Bij deze behandeling neemt u dagelijks niraparib in. In principe blijft u doorgaan met de behandeling zolang u de medicatie kan verdragen en er geen sprake is van groei van de tumor.

Het verloop van de behandeling

1. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:

| | |
|---------------------------|--|
| Niraparib capsules 100 mg | 1 x daags (2 of 3 capsules) |
| Metoclopramide 10mg | zo nodig 1-3x daags, maximaal 5 dagen achtereen gebruiken. |

Controles

| | |
|--|--|
| Controle van uw bloed: | 1 ^e maand wekelijks daarna elke 4 weken |
| Controle arts/verpleegkundig specialist: | in overleg |

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- huiduitslag
- urineweginfectie
- vermoeidheid
- duizeligheid
- hoofdpijn
- verandering van ontlastingspatroon
- invloed op de bloedcellen
- hoge bloeddruk

Gebruiksaanwijzing niraparib

- neem de capsules in volgens voorschrift van de arts
- De tabletten ten minste 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd of met een lichte maaltijd ingenomen dienen te worden.
- slik de capsules zonder kauwen door met water
- de capsules elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip innemen

Als u een dosis bent vergeten

- verdubbel nooit de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
- indien u braakt na inname van de tabletten, neem dan niet onmiddellijk opnieuw tabletten in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema

Specifieke aandachtspunten

- bespreek elke verandering in uw geneesmiddelgebruik eerst met de verpleegkundig specialist of behandelend arts. Dit geldt ook voor homeopathische middelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist. Sommige middelen mogen namelijk niet in combinatie met Niraparib gebruikt worden.

- verhoogde bloeddruk kan optreden. Controle van bloeddruk wordt geadviseerd de 1^e 4 weken wekelijks na start medicatie.