

Behandelschema: Ramucirumab /Paclitaxel kuren bij behandeling van maagkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet de Ramucirumab /Paclitaxel kuur. U krijgt beide medicijnen via het infuus toegediend op dag 1 en 15 en op dag 8 krijgt u nogmaals Paclitaxel; al deze toedieningen tezamen is één volledige kuur. De kuur wordt elke 4 weken gegeven. Afhankelijk van de respons en verdraagzaamheid wordt het aantal kuren bepaald. Deze chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:
Paclitaxel: dag 1, 8 en 15
Ramucirumab: dag 1 en 15
Daarnaast krijgt u vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus toegediend om misselijkheid en braken en een allergische reactie te voorkomen.
2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:
Metoclopramide 10 mg: dag 1 t/m 4, 8 t/m 11 en 15 t/m 18 zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid

De totale behandeling duurt ongeveer 3 uur op dag 1 en 15 en circa 2 uur op dag 8.

Controles

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur
Controle bij uw arts en /of verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de volgende kuur een week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies (vaak)
- vermoeidheid (zeer vaak)
- haaruitval
- diarree (zeer vaak)
- invloed op de werking van het beenmerg (zeer vaak leukopenie, neutropenie en trombopenie), met oa verhoogde kans op infectie en koorts
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Paclitaxel

- overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens de toediening van Paclitaxel. U krijgt op de dag van de opname en toediening van Paclitaxel medicijnen om dit te voorkomen. Reacties kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst en koorts.
- spierpijn, gewrichtspijn: dit kan optreden 2 à 3 dagen na de infusie en verdwijnt weer. Deze pijn kan bestreden worden met Paracetamol 500 mg.
- neuropathie; dit is een stoornis van de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of “doofheid” van handen en/of voeten. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u hier last van heeft, bespreek het dan tijdens uw eerstvolgend polibezoek.

- bij deze behandeling begint uw haar \pm 3 weken na de eerste kuur uit te vallen. Het is mogelijk om hoofdhuidkoeling te krijgen waardoor de kans op haarverlies wordt beperkt/voorkomen.

Specifieke aandachtspunten Ramucirumab

- overgevoeligheidsreacties (mn tijdens 1^{ste} 2 infusies) kunnen optreden tijdens de toediening van Ramucirumab. U krijgt op de dag van de opname en toediening van Ramucirumab medicijnen om dit te voorkomen. Reacties kunnen zijn: rillingen/bevingen, rugpijn/spasmen, pijn en/of drukkend gevoel op de borst, koude rillingen, blozen, benauwdheid, piepende ademhaling.
- verhoogde bloeddruk kan optreden. Controle van bloeddruk vindt plaats gedurende de behandeling met Ramucirumab.
- complicaties bij wondgenezing. Behandeling met Ramucirumab mag niet binnen 28 dagen na een ingrijpende operatie of totdat de wond geheel genezen is. Bij problemen met wondgenezing moet u altijd contact op nemen met het ziekenhuis.
- trombosevorming, hartinfarct en herseninfarct (circa 1%).
- bloedingen, neus, tandvlees, vaginaal (bloedneus zeer vaak).
- maag-darmperforatie en maag-darmbloedingen (circa 1%). Bij ernstige maag- buikpijn dient u altijd direct contact op te nemen met het ziekenhuis.
- u dient voorzichtig te zijn met het gebruik van pijnstillende ontstekingsremmers zoals Acetylsalicylzuur (bijv. Aspirine[®], Diclofenac, Brufen, Naprosyne etc.) omdat deze het maagslijmvlies kunnen aantasten en bloedingen kunnen veroorzaken.
- vochtophoping in enkels, benen, armen (zeer vaak).
- eiwitverlies in urine.

De chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

- Paclitaxel: 2 dagen