

## **Behandelschema chemoradiatie met Teysuno®**

Uw arts heeft u voorgesteld om u naast de radiotherapeutische behandeling te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De combinatie behandeling van radiotherapie en chemotherapie heet chemoradiatie. De chemotherapie is een radiosensitizer. Dit betekent dat de chemotherapie ervoor zorgt dat de tumorcellen gevoeliger worden voor de bestraling. Vanwege bijwerkingen tijdens behandeling met capecitabine (spasmes van de kransslagaderen of ernstig hand/voet syndroom) wordt overgegaan op Teysuno.

Teysuno wordt in tabletvorm gegeven. U zult deze tabletten gedurende 5 dagen per week, op de dagen dat u radiotherapie heeft innemen. De behandeling duurt in totaal 5 weken.

### **Hoe werkt Teysuno**

Teysuno® is een orale chemotherapie in capsulevorm, Nadat het in de maag is opgenomen wordt één van de bestanddelen van Teysuno® (tegafur) in het lichaam omgezet in een anti-kankerverbinding dat 5-fluorouracil (5-FU) wordt genoemd. De andere bestanddelen (gimeracil en oteracil) zijn toegevoegd om de werking te optimaliseren en de bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken.

### **Het verloop van de kuur**

De Medicatie krijgt u in tabletvorm:

Twee maal per dag .....mg, dag 1 t/m 5, dag 8 t/m 12, dag 15 t/m 19, dag 22 t/m 26, dag 29 t/m 33 (alleen op dagen radiotherapie)

Metoclopramide 10 mg Zo nodig tegen de misselijkheid 1-3x per dag 1 tablet gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met de behandelaar.

### **Gebruiksaanwijzing**

- medicijnen die u per tablet krijgt: Er bestaan tabletten van 20 en 15 mg. De dosis wordt door de arts vastgesteld.
- Teysuno® moet tweemaal daags worden ingenomen ('s ochtends en 's avonds), ten minste 1 uur vóór of 1 uur na de maaltijd met water.
- slik de tabletten zonder kauwen door met water

### **Als u een dosis bent vergeten**

- Verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meld dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- Indien u braakt na de inname van de tabletten, neem dan niet onmiddellijk opnieuw tabletten in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

### **Controles + bloed prikken**

- 1 week naar start telefonisch contact VS
- 2 weken na start chemorad VS
- 4 weken na start chemorad Oncoloog
- 1 week na chemoradiatie afspraak bij VS
- 3 weken na chemoradiatie afspraak chirurg

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben en/of de bijwerkingen ernstig zijn, bestaat de mogelijkheid dat de kuur een week wordt uitgesteld en/of de dosis aangepast wordt.

### **Algemene bijwerkingen**

- verminderde eetlust, smaakverandering, misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- zelden haaruitval
- diarree
- Bloedarmoede
- Koorts en rillerigheid
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid/huiduitslag

### **Voorzorgsmaatregelen**

Teysuno® valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en heeft enkele voorzorgsmaatregelen:

- de tabletten dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven
- het breken en/of malen is niet toegestaan.
- zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tabletten in te nemen
- na het innemen van Teysuno® wast u direct uw handen
- de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil afgevoerd kan worden

### **Overige informatie**

- Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker).
- Indien uw arts u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Wees voorzichtig tijdens het besturen van een voertuig of het bedienen van machines, omdat u door Teysuno® vermoeid en misselijk kunt worden en last kunt krijgen van wazig zien. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.

### **Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende maatregelen als extra:**

- trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tablet
- geef de tablet rechtstreeks in de mond
- handschoenen uittrekken en deze samen met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren