

Behandelschema: CyBorDex behandeling gevolgd door autologe stamceltransplantatie bij Amyloidose

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie gevolgd door stamcelverzameling en door autologe stamceltransplantatie.

De kuur bestaat uit 3 fases:

- A. Inductiefase
- B. Stamcelverzameling
- C. Chemotherapie gevolgd door stamceltransplantatie

We hebben de informatie opgedeeld in de verschillende fases. In deze informatie leest u alleen de informatie die over de eerste fase gaat. Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Cyclofosfamide, Bortezomib en Dexamethason, afgekort als CyBorDex kuur. Dit is een combinatiebehandeling met chemotherapie en doelgerichte therapie. Cyclofosfamide is een soort chemotherapie en doodt de kankercellen. Bortezomib is een zogenaamde proteasoomremmer. Remming van proteasomen zorgt ervoor dat de hoeveelheid van bepaalde regeleiwitten stijgt. Deze regeleiwitten zorgen ervoor dat de activiteit van cellen normaal blijft. Dit betekent dat de kankercellen dood gaan en dat cellen weer normaal gaan delen.

De kuur wordt eenmaal per 4 weken gegeven. U krijgt vier kuren.

Het verloop van de kuur deel A

1. Medicatie die u via een onderhuidse injectie krijgt:

Bortezomib: dag 1, 8, 15 en 22

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:

Cyclofosfamide: dag 1, 8 en 15, 1x daags

Dexamethason 10 mg: dag 1 en 2, 8 en 9, 15 en 16, 22 en 23, 1 x daags

Granisetron 1 mg: dag 1, 8, 15, 1 x daags (let op: innemen 1 uur voor de inname van de cyclofosfamide)

Metoclopramide 10 mg: zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met de behandelaar.

Co-trimoxazol 480 mg: continue*, 1 x daags

Valaciclovir 500 mg: continue*, 2 x daags

* vanaf dag 1 van de 1e kuur t/m 3 weken na de laatste kuur

De duur van de behandeling: ± ½ uur op dag 1, 8, 15 en 22

Antibiotica

Deze worden preventief gegeven om het risico op zowel eventuele virale, bacteriële als schimmelinfecties zo klein mogelijk te maken. Alle antibiotica zult u tijdens het kuren continue (elke dag) slikken. Nadat u de laatste kuur hebt gekregen, gaat u nog 3 weken door met deze tabletten, omdat uw afweer zo kort na de chemotherapie behandeling nog verminderd is.

Meld het bij uw arts en de trombosedienst indien u acenocoumarol (bloedverduuners) gebruikt. Cotrimoxazol (antibiotica) kan de werking hiervan verstoren. De trombosedienst zal daarom uw bloedwaardes vaker moeten controleren.

Controles

Controle van uw bloed: zo nodig en vóór start volgende behandeling.

Controle arts/verpleegkundig specialist: vóór start volgende behandeling.

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld zijn, bestaat de mogelijkheid dat de behandeling een week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid (kan in ernstige mate optreden)
- soms haaruitval
- invloed op de werking van het beenmerg
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Cyclofosfamide

- ontsteking van het mondslijmvlies is een veelvoorkomende klacht bij deze behandeling
- U wordt geadviseerd om veel te drinken (minimaal 2 liter/dag) op de dag van de chemotherapie
- Cyclofosfamide blijft 3 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

Als u een dosis bent vergeten

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema
- indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de tablet(ten) in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Voorzorgsmaatregelen

Cyclofosfamide valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en behoeven enkele voorzorgsmaatregelen:

- de tabletten dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven
- het breken/malen van deze tabletten is niet toegestaan
- zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tabletten in te nemen
- na het innemen van deze tabletten wast u direct uw handen
- de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil afgevoerd kan worden.

Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende maatregelen als extra:

- trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tabletten
- geef de tabletten rechtstreeks in de mond
- handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren
- was daarna uw handen

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Bortezomib

- neuropathie, dit is een stoornis aan de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of "doofheid" van handen en/of voeten. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u hier last van heeft, bespreek het dan tijdens uw eerstvolgend polibezoek.
- Bortezomib kan (ernstige) verstoppingen geven of juist diarree veroorzaken
- soms komt een griepachtig gevoel, gewrichtspijn en hoofdpijn na toediening voor. U mag hier Paracetamol voor gebruiken

- Bortezomib kan een lage bloeddruk geven, wat zich kan uiten in duizeligheid, licht in het hoofd voelen of flauwvallen. Als u hier last van heeft, bespreek het dan met uw arts.
- soms kan u last hebben van slapeeloesheid, hoofdpijn, wazig zien of angst
- huiduitslag en /of jeuk
- verlaging van bloedplaatjes komt vaak voor, waardoor het kan zijn dat u een transfusie met bloedplaatjes nodig heeft
- allergische reactie tijdens toediening van Bortezomib kan voorkomen
- risico op schade voor het ongeboren kind. Effectieve anticonceptie is noodzakelijk tijdens en gedurende drie maanden na deze behandeling.
- omdat Bortezomib op dag 1, 4, 8 en 11 toegediend moet worden, moet de behandeling altijd op maandag, dinsdag of vrijdag starten
- op de toedieningplaats kan soms wat roodheid ontstaan.
- Bortezomib blijft 7 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Dexamethason

- vocht vast houden, wat zich kan uiten in dikke voeten/ enkels en/of kortademigheid.
- verhoogde eetlust.
- Soms moeite met inslapen (neem daarom de tabletten 's ochtends in).
- bij patiënten die aanleg hebben voor suikerziekte of bekend zijn met suikerziekte kunnen de bloedsuikers verhoogd raken.