

Behandelschema Bosutinib (Bosulif®) kuur bij Chronische Myeloïde Leukemie

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Bosutinib.

Bij chronische myeloïde leukemie wordt een aanhoudend signaal afgegeven om extra witte bloedcellen te blijven produceren. Bosutinib blokkeert die signalen heel specifiek of schakelt deze uit, zodat er geen extra witte bloedcellen worden aangemaakt. Bosutinib is een medicament dat in tabletvorm gegeven wordt.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u per tablet krijgt:
Bosutinib 400 mg: 1 maal daags 1 tablet(ten)

U kunt de Bosutinib uitsluitend verkrijgen bij de Jeroen Bosch Apotheek.

Controles

Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist plaats.

Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen en/of nierfunctie zal de dosis aangepast worden.

Mogelijke bijwerkingen

- misselijkheid en braken (vaak)
- luchtweginfectie, kortademigheid, hoesten (vaak)
- diarree en buikpijn (vaak)
- huiduitslag (vaak)
- invloed op de werking van het beenmerg (vaak), met name bloedplaatjes te kort.
- vermoeidheid (vaak)

Specifieke aandachtspunten

- voor start van de behandeling dient u getest te worden op hepatitis B infectie.
- zorgt dat u bij start van de behandeling gedurende minimaal 2 dagen >2 liter/dag drinkt.
- tegen eventuele misselijkheid kunt u bij uw eigen apotheek of politheek medicijnen ophalen. Uw arts geeft hiervoor eventueel een recept mee.
- Bosutinib kan een negatieve invloed hebben op de werking van de nieren en lever. Dit kan versterkt worden bij bepaald medicijngebruik. Overleg dan ook altijd met uw arts/verpleegkundig specialist als u medicatie gebruikt of andere medicatie moet/wil gaan gebruiken.
- u kunt last krijgen van vocht vasthouden (oedeem). Vaak uit zich dit in een zwelling rond de ogen, aan de enkels, benen of andere delen van het lichaam, of aan gewichtstoename. Soms kunt u ook problemen met ademen, pijn op de borst of hoesten. Meldt dit direct.
- bot- en gewrichtspijnen, hoofdpijn, rugpijn
- er kunnen bloedinkjes ontstaan. Dit merkt u door bijvoorbeeld een bloedneus, bloedend tandvlees, blauwe plekken die spontaan ontstaan in de huid of overmatige menstruatie.
- huiduitslag: pijnlijke rode of paarsachtige huiduitslag die zich verspreidt en blaarvorming en/of andere wondjes die beginnen te verschijnen in het slijmvlies (bijvoorbeeld mond en lippen).
- er kan koorts ontstaan.
- verhoging van de bloeddruk.
- mogelijk heeft Bosutinib een negatief effect op de mannelijke vruchtbaarheid.
- een vruchtbare vrouw dient maatregelen te nemen om zwangerschap te voorkomen gedurende de therapie (bijv. anticonceptiepil).
- het risico bestaat dat behandeling met Bosutinib tot verminderde vruchtbaarheid leidt.

U dient **direct contact** op te nemen met het ziekenhuis indien u last heeft van de volgende symptomen:

- koorts en/of infectie
- tekenen van bloedingen
- diarree en braken
- vocht vasthouden
- kortademigheid of pijn op de borst
- hartritmestoornissen. Onregelmatige hartslag of flauwvallen.

Gebruiksaanwijzing

- neem de tabletten 's morgens in met voedsel
- neem de tabletten steeds rond hetzelfde tijdstip in
- slik de tabletten in zijn geheel door met water
- U dient met de behandelend arts te overleggen welke medicatie u gebruikt, omdat bepaalde medicijnen de werking van Bosutinib kunnen beïnvloeden. Bespreek ook wanneer u voedings- of kruidensupplementen gebruikt, zoals visolie, vitamine E of lijnzaad.
- Gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid en Bosutinib dient ten alle tijden vermeden te worden.
- Drink geen grapefruit-/pompelmoessap en eet geen grapefruit/pompelmoes wanneer u Bosutinib gebruikt.
- Wanneer u medicijnen gebruikt die de productie van maagzuur remmen, dan dient u deze medicatie gelijktijdig met Bosutinib in te nemen! Het niet gelijktijdig innemen van de maagzuurremmer (bijv. Omeprazol, Pantazol) kan de werking van Bosutinib nadelig beïnvloeden.
- indien er wijzigingen in uw medicijngebruik optreedt, overleg dan altijd met de verpleegkundig specialist i.v.m. mogelijke invloed van andere medicijnen op de behandeling.

Als u een dosis vergeten bent

- mocht u een dosis vergeten zijn, handel dan als volgt. Bemerkt u binnen 12 uur na het gebruikelijke tijdstip van inname dat u een tablet vergeten bent in te nemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Is dit meer dan 12 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Mocht u een dosering hebben vergeten, meldt dit bij uw arts/verpleegkundige.
- indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de tablet(ten) in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Voorzorgsmaatregelen

Bosutinib valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en behoeven enkele voorzorgsmaatregelen:

- de tabletten dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven
- het breken/malen van deze tabletten is niet toegestaan
- zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tabletten in te nemen
- na het innemen van deze tabletten wast u direct uw handen
- de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil afgevoerd kan worden.

Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende extra maatregelen:

- trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tabletten

- geef de tabletten rechtstreeks in de mond
- handschoenen uittrekken
- handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren.
- was daarna direct uw handen