

Behandelschema Imatinib kuur (oraal) bij Acute Lymfatische Leukemie en Chronische Myeloïde Leukemie

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Imatinib. Bij acute lymfatische leukemie en chronische myeloïde leukemie wordt een aanhoudend signaal afgegeven om extra witte bloedcellen te blijven produceren. De woekering van de witte cellen wordt veroorzaakt door een afwijking van het zogenaamde "Philadelphia-chromosoom", dat in de kwaadaardige cellen kan worden aangetoond. Imatinib remt heel specifiek de verhoogde celdeling die het gevolg is van dit Philadelphia-chromosoom, zodat er geen extra witte bloedcellen worden aangemaakt. Het is een medicijn welke in tabletvorm langdurig gegeven wordt.

Het verloop van de kuur

Medicatie die u in tabletvorm krijgt:

Imatinib ... mg:	continue, 1 x daags ... tablet(ten)
Metoclopramide 10 mg:	continue, zo nodig tegen de misselijkheid 1-3x per dag 1 tablet gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met de behandelaar.

U kunt de Imatinib uitsluitend verkrijgen bij de Jeroen Bosch Apotheek.

Controles

Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist plaats. Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen zal de dosis aangepast worden.

Algemene bijwerkingen

In het algemeen zijn de bijwerkingen van Imatinib mild. Ze komen vooral voor in de eerste maand van de behandeling en nemen daarna meestal af. Echter dit verschilt per persoon.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- diarree
- invloed op de werking van het beenmerg
- veranderingen van de huid/huiduitslag

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- indien u misselijkheid ervaart, kunt u om een recept tegen eventuele misselijkheid vragen.
- u kunt last krijgen van vocht vasthouden (oedeem). Vaak uit zich dit in een zwelling rond de ogen, aan de enkels, benen of andere delen van het lichaam, of aan gewichtstoename in het algemeen. Dit is vrij onschuldig. Uw arts kan u eventueel een diureticum ('plaspil') voorschrijven, waardoor u meer urine produceert en dus minder vocht vasthoudt.
- er kan spierkramp ontstaan. Dit is meestal niet hevig en eenvoudig te verhelpen met calciumsupplementen die uw arts u kan voorschrijven.
- er kunnen bot- en gewrichtspijnen, in het algemeen gedurende de eerste maand. De pijn verdwijnt vaak na ongeveer twee maanden.
- huiduitslag welke meestal in de vorm van rode vlekken of jeuk kan optreden
- hoofdpijn, duizeligheid en slapeeloosheid kunnen voorkomen
- verhoogde traanafscheiding, wazig zicht, oogbindvliesontsteking kunnen voorkomen
- een vruchtbare vrouw dient anticonceptie maatregelen (pil/condoom) te gebruiken gedurende de behandeling

- Imatinib blijft 7 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

Waarschuwingen

- bepaalde medicijnen kunnen de werking van Imatinib beïnvloeden. Bespreek met uw arts uw medicijngebruik.
- U mag géén grapefruitsap in combinatie met Imatinib gebruiken, dit kan namelijk de concentratie van Imatinib verhogen.
- U mag géén sint- janskruid in combinatie met Imatinib gebruiken, dit vermindert namelijk de werkzaamheid van Imatinib.

Gebruiksaanwijzing

- neem de tablet(ten) in tijdens de hoofdmaaltijd met een groot glas water.
- slik de tablet(ten) zonder kauwen door met water. Indien het doorslikken van de medicijnen niet in zijn geheel lukt, dan mogen de tabletten opgelost worden in een groot glas water of appelsap (ca. 50 ml voor een 100 mg tablet en 200 ml voor een 400 mg tablet).
- er blijven dan wat restjes in het glas achter, wat echter geen invloed heeft op de werking. Direct opdrinken.

Als u een dosis bent vergeten

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de tablet(ten) in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Voorzorgsmaatregelen

- Imatinib valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en behoeven enkele voorzorgsmaatregelen:
- de tabletten dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven
- het breken/malen van deze tabletten is niet toegestaan
- zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tabletten in te nemen
- na het innemen van deze tabletten wast u direct uw handen
- de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil afgevoerd kan worden.

Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende extra maatregelen:

- trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tabletten
- geef de tabletten rechtstreeks in de mond
- handschoenen uittrekken
- handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren.
- was daarna direct uw handen