

Behandelschema Ibrutinib (Imbruvica®) bij Chronische Lymfatische Leukemie/mantelcellymfoom/Waldenström

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Ibrutinib. Ibrutinib wordt gegeven wanneer u reeds eerder behandeld bent met chemotherapie. Het medicijn blokkeert signalen zodat kwaadaardige cellen niet kunnen overleven. Ibrutinib wordt in tabletvorm gegeven. De behandeling met Ibrutinib wordt gestaakt wanneer de ziekte weer actief wordt, dan wel er teveel bijwerkingen optreden.

Het verloop van de kuur

Medicijnen die u per tablet krijgt:

- Ibrutinib mg: 1 maal daags 1 tablet

U kunt Ibrutinib uitsluitend verkrijgen bij de Jeroen Bosch Apotheek.

Controles

Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist plaats. Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen zal de dosis aangepast worden.

Algemene bijwerkingen Ibrutinib

- in het algemeen zijn de bijwerkingen van Ibrutinib mild en worden de tabletten goed verdragen. Er zijn echter een aantal bijwerkingen die regelmatig (zeer vaak >10%) gezien worden:
- invloed op de werking van het beenmerg
- duizeligheid
- hoofdpijn
- longproblemen in de vorm van longontsteking (hoesten, benauwdheid, eventueel met koorts)
- spier- en gewrichtspijn
- huiduitslag
- misselijkheid, braken
- mondproblemen
- diarree of obstipatie (hardlijvigheid)

Specifieke aandachtspunten

- tegen eventuele misselijkheid kunt u bij uw eigen apotheek of politheek medicijnen ophalen. Uw arts geeft hiervoor eventueel een recept mee.
- vrouwen in de vruchtbare periode dienen naast de pil een tweede anticonceptiemiddel te gebruiken tot tenminste 3 maanden na het staken van de behandeling. De werking van Ibrutinib op de pil is namelijk niet bekend.
- Indien u een operatie moet ondergaan overleg dan met uw arts. De inname van Ibrutinib dient 3-7 dagen van te voren gestopt te worden ivm verhoogde kans op bloedingen.
- drink circa 2 liter per dag
- Ibrutinib blijft 7 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

Meldt direct wanneer u last hebt van:

- huiduitslag met jeuk en bultjes, moeilijk ademhalen, gezwollen lippen, mond of tong. Dit kan te maken hebben met een allergische reactie op het medicijn.
- tekenen van infectie (bijv koorts)
- bloedingen

- hartkloppingen of benauwdheidsklachten. Er kan dan eventueel een hartfilmpje gemaakt moeten worden.

Gebruiksaanwijzing

- De tablet kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
- De tablet dient zonder te kauwen of te breken ingenomen te worden met water.
- neem de tabletten elke dag rond hetzelfde tijdstip in.
- U dient met de behandelend arts te overleggen welke medicatie u gebruikt, omdat bepaalde medicijnen de werking van Ibrutinib kunnen beïnvloeden (bijv. bloedverdunners, pijnstillers, visolie, vitamine E, lijnzaad)
- Meldt het aan uw arts/verpleegkundige wanneer u onder behandeling van de trombosedienst bent!
- Gebruikt het u medicijn digoxine (Lanoxin®), dan dient u deze minimaal 6 uur voor of na Ibrutinib in te nemen
- U mag GEEN grapefruit, pompelmoessap, zure sinaasappels (pomerans) , Sintjanskruid, Vitamine E en visolie gebruiken in combinatie met Ibrutinib.

Als u een dosis vergeten bent

- Mocht u een dosis vergeten zijn, handel dan als volgt. Een gemiste dosis zo snel mogelijk op dezelfde dag innemen en de volgende dag doorgaan met het normale schema.
- Merkt u pas de volgende dag dat u een dosis gemist hebt? Sla de vergeten dosis dan over. Mocht u een dosering hebben vergeten, meldt dit dan wel bij uw arts/verpleegkundige.
- Indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de tablet(ten) in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Voorzorgsmaatregelen

- Ibrutinib valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en behoeven enkele voorzorgsmaatregelen:
- De tabletten dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven
- Het breken/malen van deze tabletten is niet toegestaan
- Zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tabletten in te nemen
- Na het innemen van deze tabletten wast u direct uw handen
- De verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil afgevoerd kan worden.

Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende extra maatregelen:

- Trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tabletten
- Geef de tabletten rechtstreeks in de mond
- Handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren.
- Was daarna direct uw handen