

Behandelschema: MBVP kuren bij Non-Hodgkin lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u voorgesteld is, heet MBVP kuur en bestaat uit een combinatie van medicijnen. Eenmaal per vier weken krijgt u een kuur. U krijgt in totaal twee tot drie kuren. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie wordt klinisch gegeven. U wordt opgenomen van dag 0 t/m dag 4 en dag 14 t/m dag 16. Afhankelijk van de Methotrexaat-spiegel in het bloed, kan de opname langer duren.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via een infuus krijgt
Methotrexaat (MTX): dag 1 en 15
Etoposide: dag 2
Carmustine: dag 3
Folinezuur: start 24 uur na Methotrexaat om de 6 uur, totdat MTX-spiegel goed is (intraveneus of oraal)
Voor de toediening van de cytostatica krijgt u via het infuus medicijnen toegediend om misselijkheid en braken te voorkomen.
2. Medicijnen die u lumbaal (via een ruggenprik) krijgt
Methotrexaat/Prednison dag 1 en 15
Cytarabine: dag 1 en 15
3. Medicijnen die u per tablet krijgt
Prednison ...mg: dag 1 t/m 5
Dexamethason 8mg: dag 15, 1 uur voor de kuur, en dag 16 en 17
Granisetron 2mg : dag 1,2,3 en dag 15, 1 uur voor de kuur
Metoclopramide 10 mg: Zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

In verband met hoge dosering Methotrexaat krijgt u vooraf en na toediening extra infuus met Natriumbicarbonaat, wordt er regelmatig bloed geprikt om de MTX-spiegel te bepalen en zal de zuurgraad van de urine twee maal daags gemeten worden.

De tweede kuur start op dag 29.

Controles

Controle van uw bloed: volgens afspraak arts
Controle arts: volgens afspraak arts

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de kuur wordt uitgesteld.

Mogelijke bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies (zeer vaak)
- vermoeidheid
- haaruitval

- invloed op de werking van het beenmerg
- verandering van de huid
- verandering van het ontlastingspatroon
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid en seksualiteit

Specifieke aandachtspunten

- tegen eventuele misselijkheid krijgt u van de arts of verpleegkundige een recept mee voor medicijnen die u bij uw eigen apotheek/politheek kunt ophalen
- Folinezuur heeft geen nadelige gevolgen/bijwerkingen
- Carmustine kan soms opvliegers geven tijdens toediening en pijn bij de injectieplaats.
- bij deze behandeling begint uw haar \pm 3 weken na de eerste kuur uit te vallen
- lumbale toediening van Methotrexaat en Cytarabine kunnen hoofdpijn, braken en koorts geven. Soms ook vreemde gevoelswaarnemingen (bijv. alsof er mieren over de huid lopen)
- De chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.
 - Methotrexaat 7 dagen
 - Etoposide 4 dagen
 - Cytarabine 2 dagen

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Prednison:

- kan de eetlust verhogen
- kan stemmingswisselingen geven
- kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen
- kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van Prednison wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de prednison kunt u zich wat lusteloos voelen