

Behandelschema: Anagrelide (Xagrid®) bij essentiële trombocytose

U bent bekend met essentiële trombocytose. Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte nu te gaan behandelen met het medicijn Anagrelide. Dit medicijn verlaagt het aantal bloedplaatjes.

Dit medicijn wordt voorgeschreven wanneer u de bestaande therapie niet kunt verdragen of dit middel (meestal hydrea) onvoldoende effectief is.

Het verloop van de behandeling

Medicijnen die u per capsule krijgt:

Anagrelide ... mg: ... daags ... capsule(s)

De dosering van het medicijn anagrelide wordt gebaseerd op het aantal bloedplaatjes.

Bij het starten van anagrelide dient u minimaal één week een dosering van 2x 0,5 mg Anagrelide te gebruiken. Na deze week wordt de dosering per persoon bepaald afhankelijk van het effect op de bloedplaatjes.

Gebruiksaanwijzing

- neem de capsule(s) van de ochtend- en de avonddosis in volgens voorschrift van de arts
- u kunt de capsule(s) zowel met als zonder voedsel innemen.
- slik de capsule(s) zonder kauwen door met water

Als u een dosis bent vergeten

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts / verpleegkundig specialist.
- indien u braakt na inname van de capsule(s), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de capsule(s) in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Controles

Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts plaats. Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen zal de dosis aangepast worden.

Bijwerkingen die kunnen optreden (komen zeer vaak/vaak voor):

- misselijkheid en/of braken
- diarree, buikpijn, winderigheid
- bloedarmoede
- vocht vasthouden
- huiduitslag
- vermoeidheid
- hoofdpijn/duizeligheid
- hartkloppingen

Aandachtspunten

- vertel uw arts altijd of u andere medicatie gebruikt. Sommige medicijnen beïnvloeden namelijk de werking van Anagrelide.
- vrouwen die zwanger kunnen worden dienen effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling van Anagrelide.
- wanneer er sprake is van duizeligheid wordt het afgeraden om auto te rijden of machines te bedienen
- meldt het uw arts als u bekend bent met een hartaandoening