

Behandelschema: ABVD kuren bij een Hodgkin Lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie. De behandeling die u krijgt heet ABVD kuur en bestaat uit een combinatie van 4 verschillende soorten cytostatica (= celgroeiremmende middelen).

Een kuur bestaat uit: dag 1 en 15 een infuus. De kuur wordt eenmaal per 4 weken gegeven. U krijgt maximaal 8 kuren. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze kuur kan poliklinisch gegeven worden.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via een infuus krijgt:

Doxorubicine	dag 1 en 15
Bleomycine	dag 1 en 15
Vinblastine	dag 1 en 15
Dacarbazine	dag 1 en 15

2. Medicijnen die u per tablet krijgt om misselijkheid en braken te voorkomen:

Akynzeo 300mg/0.5 mg:	dag 1 en 15, 1 uur vóór de start van de chemotherapiebehandeling innemen
Dexamethason 8 mg:	dag 1 en 15, 1 uur vóór de start van de chemotherapiebehandeling innemen
Dexamethason 8 mg:	dag 2, 3 en 4 en dag 16, 17 en 18, 1x daags (bij voorkeur tijdens/na ontbijt innemen)
Metoclopramide 10 mg:	Zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De behandeling duurt ± 3 uur.

Controles

Controle van het bloed: vóór start nieuwe kuur en zo nodig op dag 15

Controle bij de arts/verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de kuur wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid (kan in ernstige mate optreden)
- haaruitval
- invloed op de werking van het beenmerg
- verandering van het ontlastingspatroon
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- verandering van de huid

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- op de eerste dag kan de urine rood gekleurd zijn van de medicijnen
- op de dag van toediening van Bleomycine en Dacarbazine kan een griepachtig gevoel en koorts optreden, gebruik zo nodig paracetamol 500 mg
- perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door

een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van de kuur.

- bij te snelle toediening van Dacarbazine kunnen er krampen in de bloedvaten optreden. Het gebruik van warme of koude compressen kan de lokale pijn voorkomen of verminderen.
- Vinblastine kan (ernstige) verstopping geven
- bij deze behandeling begint uw haar \pm 3 weken na de eerste kuur uit te vallen.
- ontsteking van het mondslijmvlies komt vaak voor
- pigmentatie van de huid (is vele jaren zichtbaar)
- rode verkleuring van het gezicht
- longontsteking. Soms kan het toedienen van Bleomycine leiden tot verbindweefseling van de longen. U kunt dit ervaren als toegenomen benauwdheid of een droge hoest. Meldt dit altijd bij uw behandelaar.
- U dient, indien van toepassing, tijdens en tenminste 1 maand na gebruik Akynzeo anticonceptie maatregelen te nemen.
- De chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de informatiewijzer. De aanwezigheid in de uitscheiding is per medicijn als volgt:
 - Doxorubicine: 6 dagen
 - Bleomycine: 3 dagen
 - Vinblastine: 2 dagen
 - Dacarbazine: 1 dag